

ב"ה

אין ליכט

פון תורה

ספר

סגולות ורפואות

רפאל המלאך

חלק ב'

אידיש

447

הוצאת אמונה

ברוקלין נוא יארק,

שנת תשמ"ז לפ"ק

סגולות ורפואות

דער ספר איז איינגעטיילט אין צוויי חלקים

חלק א. בעשריבט סגולות צו אלערליי קראנקהייטען. אזעלכע סגולות וואס זענען מקובל פון די פערצייטלישע צדיקים, און זענען געהערט יעדן פון דור דורות. איבערגעזעצט אויף ווארנאן פון הייליגן ספר

רפאל המלאך


וואס דער מארלער רבי שליט"א פון לאדז האט מחבר געווען.

חלק ב. בעשריבט רפואות צו אלערליי קראנקהייטען. רפואות פון אפטמיק מעדיצינען, וואס זענען ערלויבט יעדן צו פערקויפן. און רפואות פון הייליכע מיטלען וואס מען קאן זי אליין מאכען. איבערגעזעצט געווארען פון די בעסטע ראקטאר בוכער פון די לעצטע יארהען.

נאכדריק שטרענג פערבאטען

פערלאז פון יצחק שלאמאוויטש סקלאד ספרים אין לאדז,

נאוואמינסקא 22



Сеферъ „Рaphaelъ Гамалохъ“ Ангелъ Raphaelъ т. е. сборникъ статей популярной гигиены и домашнихъ лекарствъ

Соч. Раввина Ю. Розенберга.

Собственность автора и книгопродавца И. Шлямовича.

רפואות

חלק שני

(א)

אויגען. אויגען=קראנקהייטען זענען פֿערהאנגען פֿיל מינים, און יעדער קראנקהייט דארף האבען א אנדערע רפואה, און אטמיניסטענס מינים אויגען=קראנקהייט זענען פֿארעכענט צווישען די אַנשטעקענדע קראנק-הייטען. אזא איז דאָס גלייכסעץ און פֿאַר פֿון אַשווערע אויגען=קראנקהייט, צו ווענדען זיך צו אַ ספּעציעלען אויגען=דאָקטאָר. און די שטוב=מענשען זאָלען זיין געזיכטען, זאָלען זיך נישט אַבווישען מיט דעם האַנד=טוף, וואָס דער אויגען=ליידענדער האָט זיך אַבגעווישט דאָס פנים. דעס גלייכען ביי דעם זעלבען מענש אויף, אויב ער האָט די אויגען=קראנקהייט אין אַמין אויג זאָל ער זיך שטארק היטען אַנצורירען דאָס אנדערע געוונדע אויג, מיט דער זאך וואָס האָט אַנגעריירט דאָס קראַנקע אויג.

אויגען. צו אַ געווענטליכע אויגען=אַנצינדונג, דאָ ווי קיין אויגען=דאָקטאָר איז נישט דאָ, זאָל מען צוועהגען קאמפרעסלעך קאלטע פֿון גאָלדעראַוואַ=וואַסער, וועלכעס מען בעקומט צו קויפֿען אין אַפּטעק Woda Golderowa. אָדער פֿון בור=זייערע וואַסער, מען זאָל פֿאַבריהען אַ לעפֿער בור=זייערע און אַ האַרב גלאָז קאָלענדיגע וואַסער, דאָס קאָמט מען אַבקהלען און מען טינקט אַזיין אין דעם גאָז, און מען לעהנט צו צום אויג אַלע מאָהל אַ פֿריש קאמפרעסער. אויב עס ווערט נישט בעסער פֿון קיין קאלטע קאמפרעסלעך, קאָן מען פֿרייבען צוועהגען הייסע קאמפרעסלעך פֿון הייס וואַסער. נאָר אַ הייס קאמפרעסל מיט שוין האַבען פֿון אויבען אַ דין צעראַטקערע מיט וואַסער פֿערבאנדענע שוויט.

אויגען. צו אַנאָיגען=אַנצינדונג. הויזליכע רפואה, מען זאָל נעמען אַ ווייסלעכע פֿון אַ פֿריש הינערען איי, מען זאָל עס גוט ציקלען-פֿען, און מען זאָל צו מוישען אַ גרויסען עס-לעפֿעל שטארקען בראַנפֿען. אין דעם זאָל מען איינטינקען טיכערעך און צוועהגען צום אויג. אַלע מאָהל פֿריש.

אויגען. אויב די אויגען זענען ריין, נאָר עס האָט זיך געמאַכט אויף דער פֿרעה אַ געשווירעל, וועלכעס מען ריפֿט אַ גערשטען. הויזליכע רפואה, מען זאָל איינטינקען אַ שטיקעל ווייכע זעמער אין וואַרעמע טיכער, דאָס זאָל מען אַרויפֿלעגען אויף אַ שטיקעל וואַסער און צוועהגען צום אויג 3 מאָהל טעגליך.

אויגען. צו אַנעווענליכע אויגען. אַ הויזליכע רפואה, צונעמען אַ האַרב

גליון קאבעדינג וואסער, אריינצולעהנען א קלענעלע צוקער און
א שטיקעל „ניקס“, וועלכעס מען בעקומט צו קויפֿען אין אפטיק. דאָס
שטיקעל „ניקס“ איז גענוג עס וואָל זיין גרויס בערך אַסערקישע גוס. אויף
דאָס מען אַרײַנשוהן 5 בשם-גענעלעך. דאָס וואָל אזוי שטעהן 24 שעה אויף
א וואַרעם אָרט. איבער די צייט וואָל מען עס עטליכע מאָהל איבער-
מישען. נאכהער וואָל מען עס איבערווען דורך אַרײַן טיכעל, און מען
וואָל עס אַרײַנמישען אין אַרײַן פלעשילע. פון דעם איז גענוג אַרײַנצולאָוען
אין קראַפֿע אין אויג אַרײַן אַלע טאָג. אַזעלכע 3 קראַפֿליס קאָנען אין
גאנצען אויסהיילען דאָס אַנצונדונג. די רפואה איז באַסח זעהר גוט. מען
מאכט זי אין מיטל אפטיקען אויף.

אויגען. עס איז פֿערהאן אַזויגען-קראַנקהייט, וועלכע רופט זיך „היגע-
בלענדונגהייט“. די קראַנקהייט באַשטעהט פון דעם, אז אזוי ווי
עס הייבט גאָר אָהן נאכט צו ווערען, ווען די היגע פֿלעהען אַרויף אויף
ווערען ערטער צום שלאָפֿען, אזוי ווערט דער קראַנקער בלינד און הערט
אויף צו זעהן, האַטש די אויגען טוהן עס גאָר נישט וועה. צו דער
קראַנקהייט העלפט אַהויולד מיטער, מען וואָל קויפֿען אַלעבער פון
אברהם און מען וואָל זי קאָכען אין אַפֿאָן, בשעת עס קאכט זיך און
עס געהט אַרויס אַפֿארע פֿון דער פֿאָן, וואָל דער קראַנקער האַלטען דאָס
פנים מיט אַפֿענע אויגען איבער די פֿארע, אזוי וואָל ער זיך האַלטען די
גאנצע צייט פון קאכען. דערנאָך וואָל מען עס געבען די לעבער אויף צו עסען.

אויער. צו אויערען וועהטאָג. אפטיק רפואה, צו קויפֿען אין אפטיק
קאמפֿאָר-עהל Ol. camphor מיט „קייפֿומי-עהל“ Ol. caeputi
אויסצומישען גלייך אויף גלייך. אַינצומישען אין דעם אַ שטיקעלע וואַסער
און אַרײַנצולענען אין אויער.

אויער. צו אויערען וועהטאָג. הויזליכע רפואה, אַנצוגרעסען אַ ציבערע,
אויסצוריקען דעם וואַס און אויס צו מישען מיט מאַנדעל-
עהל Ol. amygdal גלייך אויף גלייך. אַינצומישען אַ שטיקעלע וואַסער
און אַרײַנצולענען אין אויער.

אויער. צו אויערען וועהטאָג. הויזליכע רפואה, צו נעמען אַ פֿרישע
גאָר פֿון וואָס פֿאַר אַבהט עס איז. אַרײַנצומישען אין אַ גלעזעל
און צו צומישען ברוםס מילך גלייך אויף גלייך. דאָס אַ ביסעל צו דער-

ווארעמען אויפ'ן פֿייער און נוט אויסצומישען. אריינצולאָזען פֿון דעם
אין אייער א ווארומע קראַפֿלע.

אוייער. צו אויערען וועהטאָג ביי וויינענדיגע קינדער. איז א רפואה צו
די מוסער וואָ עטליכע מאָהל זיין טאָג אריינשפּריצען אין
אוייערל ברוסט מילך, אין עטליכע מינוט ארום וואָ מען אויסווישען דאָס
אוייערל מיט וואַסע.

אוייער. אויב עס האָט זיך געמאַכט אַ פֿלוס אין אויער און עס רינט
אויסער. דאָרף מען צוויי מאָהל טעגליך אויסשפּריצען דאָס
אוייער מיט וואַרעמען ברוזויערע און אויסצווישען מיט וואַסע. אָבער ביי
דעם מוז מען זיך ווענדען צו אַ אויערען-דאָקטאָר.

אוייער. צו אַ רוישונג אין אויער, אויך אין אַהאלבען קאָפּ.
אפטמאָל רפואה, אַרײַן צו טוהן אַ עס לעפֿעל, קאַלי-
בראָמאַט *Kali bromati* אין אַ גלאָז וואַסער, און צו טרינקען פֿון
דעם וואַסער פֿון 4 ביז 6 לעפֿעל טעגליך.

אוייער. צו אַ רוישונג אין אויער. הויזליכע רפואה, צו צושניידען
אַ אַתרוג אויף קליינע שטיקלעך, און דאָס צו קאָכען מיט
פֿראַוואַנס בוימעהל. פֿון דעם בוימעהל אַריינצולאָזען אין אויער אלע
טאָג אַ קראַפֿלע.

אוייער. צו אַ רוישונג אין אויער. הויזליכע רפואה, צו נעמען
אַ פֿרוישע גאל פֿון וואָס פֿאַר אַ בהמה עס איז, אַרײַן צו
ניסען די גאל אין אַ קליין ריין מעפעלע, צו צומישען פֿראַוואַנס בוימ-
עהל גרייך אויף גרייך, און אַכטעל איינער צו קאָכען אויפֿן פֿייער,
און נאָם אַרויף צו מלשען. פֿון דעם בוימעהל אַריינצולאָזען אין אויער
אלע טאָג אַ קראַפֿלע.

אוייער. אויב דאָס אויער שטעהט אָב פֿון הערען. הויזליכע רפואה,
צו נעמען אַ שטיקל גענוען פֿעסען און אַ שטיקל הינערען
פֿעסען אומגעלאָזען, אויסצולאָזען דאָס צוואַסען אויפֿן פֿייער. נאָכהער
אָבצולייטערען דאָס פֿעסען אין אַ גלעזעל. און פֿון דעם פֿעסען אַרײַן צו
לאָזען אין אויער אלע טאָג אַ קראַפֿלע.

אוייער. אויב עס איז אַרײַן אין אויער עפעס אַסאך ווערמעל. אפטמאָל
רפואה, צו קויפֿען אין אפטמאָל, בוימער-מאָדיל-עהל
oli amygdali amar צו דערוואַרעמען אַכטעל, און אַרײַן צו לאָזען
אין אויער עטליכע מראָפֿען, וועט דאָס ווערעמל אַרויס שוויסען.

אויפער. אויב עס איז אריין אין אויפער עפעס א מין ווערעמל. הויזליכע רפואה, צו דערווארעמען בוטער מיט וואלץ, און אריינצולאזען אין אויפער עטליכע טראפען. וועט דאס ווערעמל ארויס שווימען.

אונטער-לייב. דאס הייסט די סטאלצאוו-קוישקע אויב זי פאלט ארויס. הויזליכע רפואה צו מאכען זיך בעדער פון דעמבאוו-סקורא cortex quercus דאס צו קאכען אין וואסער ביז דאס וואסער ווערט רויט, דאן גיסט מען עס אריין אין א טיפע שניטל, און דער קראנקער וואל אין דעם וואסער ווצען אלע טאג בערך א האלבע שעה.

אונטער-לייב. ווען עס פאלט ארויס, דארף מען דאס שטוקער קוישקע אָנצושטירען מיט א וואלץ, כדי זי וואל זיך צוריק גרינג אריינציהן, אזא וואלץ קאן מען זיך מאכען אליין. מען נעמט באקקען-חלב און מען צולאזט עס ביז דעם פֿייער. אדער מען קויפט אין אפטיק „וואזעלינא“ Vaseline און מען צולאזט עס ביז דעם פֿייער. אז דאס איז שוין געווארען גוט שטער, נעמט מען עס אוועק פֿון פֿייער, און מען נעמט אראב דערפֿון א עס-לעפער און מען גיסט עס אריין אין אריין גלאז. נאכהער מישט מען צו צו דעם א געלעכץ פֿון א הינדערען אײ. דאס מישט מען גוט אויס און מען לאזט עס אָב-קיהלען. איז עס א גוטע וואלץ צו דער קראנקהייט.

אורין. אויב די אורין געהט נישט אזוי ווי געווענליך, בעווייזט דאס אויף א אינערליכע קראנקהייט. עס איז פֿערהאן פֿיעל קראנק-הייטען, וועלכע רופען ארויס די צרה, אז דער מענטש קאן נישט קיין אורין לאזען, אזוי ווי עס דארף זיין. אמאאל מאכט זיך דאס פֿון דעם, וואס די בלאז איז פֿערקיהלט געווארען, און עס דאס זיך נעמאכט א קאטהאר אין דער בלאז. אמאאל מאכט זיך דאס פֿון דעם, וואס עס געפֿינט זיך וואס אין אויך קליינענקע שטערנדעלעך אין דער בלאז און אויך אין די נירען. אמאאל מאכט זיך דאס איבער א נירען-אָנציהונג. אזא מוז מען ביז דער קראנקהייט ווענדען זיך צו א דאקטאר, וועלכער קאן בעשטימען דורך געוויסע סימפטאמען וואס פֿאר א אינערליכע קראנק-הייט געפֿונט זיך דאָרט.

אורין. אויב מען וועט אז די אורין איז לויטער, און דער מענטש

אין נישט שראף אויף א נירען-קראנקהיט. אין דאס א בעווייז
אז די אורזאכע פון דער קראנקהיט איז, וואס די בלאז איז גע-
ווארען פערקיהלט. אין דעם פאל קאן מען מוהן עטליכע הוייליכע
מיטלען. ערשטענס איז גוט צו קאכען פעטרושקא, און צו געבען דעם
קראנקען דאס וואסער פון דעם געקעכץ צו טרינקען. אויך איז גוט איהם
צו קאכען האבער גריין צום עסען. און אויב מען בעקומט קנאבעל-
וואסער וואס מען איבערקאכען 2 לעפער קנאבעל-וואסער און א קווארט
וואסער. דאס וואס מען אבוינען אין א פלעשער אריין. פון דעם וואס
דער קראנקען טרינקען אלע 2 שעה א עס-לעפער. ביז קונדער, א
קאווי-לעפער.

אורין. צו אורין-פערעהאלטונג איז אויך גוט צו מאכען דעם קראנקען
ווארימץ בעדער. נאך בעסער איז, מען וואס קאכען אין דעם
וואסער וואסער אדער האבער-שטרוי.

אורין. אין אזא פאל פון אורין-פערעהאלטונג איבער א פערקיהלונג
העלפט אמאהל די אפטיק רפואה. מען וואס קיפערן אין
אפטיק בודשטין עלי *oli Succines* פון דעם וואס מען געבען דעם
קראנקען צו טרינקען 3 מאהל טעגליך בערך צו 5 קראפלעס אין ווישע
וואסער אדער אין סעלטצער וואסער.

אורין. ביז די אנדערע פאלען פון אורין-פערעהאלטונג, איבער א נירען-
אנצינדונג, אדער איבער זאמד מיט שטינדלעך, וואס מען וואס
אריין גאר נישט העלפען נאר מען וואס וואס וואס צו א דאקטאר.

אורין. דער מענטש וואס ליידעט אויף אורין-קראנקהיט, טאר נישט
טרינקען קיין שום משקה, וועלכע ענטהאלט אין וואס אלבאדאל.
אורין. עס טרעפט ביז גרויסע מענשען אויך אמאהל, און אסמיינסענס
ביז קונדער ביז 15 יאהר, וואס קאנען נישט אינהאלטען די
אורין אין לאיזן אורין אין בעס. צו דעם איז גוט פאלגענדע הוייליכע
מיטלען:

- (1) צו מאכען איהם וואנעס פון ווארעם וואסער, אין וועלכען עס
איז געקאכט געווארען שוועבעל, געשמויסען אויף קריינע שטוקלעך.
- (2) צו מאכען איהם וואנעס פון ווארעם וואסער, אין וועלכען עס איז
אסמיינסענס פון דער אפטיק.
- (3) דער קראנקער וואס עטליכע שעה פארן שלאפען נעהן נישט
טרינקען נישט קיין שום נישט קיין וואסער.

(4) דער קראנקער וואל פאר'ן שלאפען געהן אלע נאכט טרינקען אלעפעלע טרינק-סאדע אין א דריטעל גלאז מילך.

(5) מען וואל זעהן אז דאס בעט פון דעם קראנקען וואל זיין נידריגער צו קאבענס ווי צו פיסענס.

(6) מען וואל קיפ'ען אין אפטיק קומעל-עהל אין מען וואל געבען דעם קראנקען 3 מאהל טעגליך צו 5 קראפלעס אין א גרעזעל רויט-וויין.

אָנאַניזם. (בעשה אינז) דאָס איז א קראַנקהייט וואָס פֿערדאַרפט ביי דעם מענטש דעם קערפּער מיט דעם גייסט, ביי דעם צו זאָמען. די קראַנקהייט איז אזוי ווי די אלפֿאהאַליום-קראַנקהייט. אין אַזוי הויב טרינקט דער מענטש אַט גלאַס אזוי א שטאַרק גלעזעל אָקעוויט. דערנאָך הויבט ער אָהן צו טרינקען גרעסערע גלעזעלעך שפּירט, און אזוי אלע מאָהל ווייטער, הייסט עס שוין אז ער הויבט אָהן שיכור'ן, בון ער פֿאַלט אַרײַן אין אלפֿאהאַליום-קראַנקהייט, און עס ווערט פֿון דעם מענטש אַ באַרג אש, דער קערפּער ווערט פֿאַברענט, און אזוי אויך ווערט דער גייסט פֿערדאַרבען.

דאָס וועלכע איז ביי דער אָנאַניזם-קראַנקהייט. דער אינגעל אָדער דער יונגער מענטש, וואָס הייבט נאָר אָהן צו טוהן די „בעשה רע“ ציהט עס איהם שוין אַרײַן אין די בעסטיאלישע תּאוה אלע מאָהל ווייטער און ווייטער, בון דער קערפּער פֿון דעם מענטש ווערט אזוי ווי אַ אײַס-געקוועטשטע אפּעלסין. ערשטענס ווערט ער קראַנק אויף פֿאַלוציאַן, און אויף טריפּער. און פֿון דעם האָפענונג ער וואָל אַמאָהל קאָנען פֿיהרען מיט אַ ווייב אַ פֿאַמיליען-לעבען און וואָל ווערען אַ מאָהל אַפֿאַמער, מעג ער שוין פֿאַרגעסן. אײַסער דעם ווערט אזא מענטש קראַנק אויף נע-אוראסמעני. זינע געווען ווערען שוואַך אזוי ווי פֿערפֿוילטער גארען. די געהורען טרוקענען ביי איהם, דער שכל ווערט אלע מאָהל שוואַך און טעמפּער, אזוי ווייט אז ער קאן נישט צוזאמען שמעלען אפילו קיין קליינעם רעכנונג. ב, אַזאַר אלע בחורים און יונגע לייט וואָס ווערען משוגע. זי די אורזאַכע דערפֿון אָנאַניזם.

אָנאַניזם. קיין רפּואה צו דער קראַנקהייט איז נישט דאָ. די איינציגע רפּואה צו דעם איז נאָר „סור מרע“. דאָס הייסט אז אויב די עלטערן פֿון דעם אינגעל באַמערקען דאָס בעצייטענס, וואָלען זיי איהם אין גוטען אָבשטראַפֿען און וואָלען איהם אויפֿטערקואַם מאַכען, ווי ווייט

שערלך דין מעשה רע קאן ווירקען אויף זיין קערפער, און אויף זיין גימט. נאר אויב ער איז שוין פערקראכען צו ווייט, און איז שוין אריין געפאלען אין א קראנקהייט. דאן מוז מען זיך שוין ווענדען צו א נערווען-דאקטאר אדער צו א אנדערען דאקטאר, וועלכער נעהער ספעציעל צו דער קראנקהייט, אויף וועלכער ער איז קראנק געווארען.

אסטמא. דאס הייסט זעהר א שווערע קראנקהייט, וואס דער מענטש פערלירט דעם אטעם, דורך וועלכען ער פערלירט דעם פערשטאנד אויך, און איז דאמאלס גענוער צום טויט ווי צום לעבען. די קראנקהייט אסטמא איז פערהאנען צוויי ערליי: הארץ-אסטמא, אין לונגען-אסטמא. הארץ-אסטמא דערנעמט זיך דורך דעם שוואכקייט פון הארץ, לונגען-אסטמא דערנעמט זיך פון די לונגען-שוואכקייט, וואס די רערקע פון די לונגען ווערען פערשטאפט מיט לחות, דורך וועלכען די לונגען האבען קיין קראפט נישט אריין צו אטעמען די לופט. די בידערליי קראנקהייטען פאדערען צו ווענדען זיך צו א דאקטער, אויך פאדערען זיי זעהר נויטיג פרישע לופט, דער קראנקער זאל זיין אויף א דאמטשע צווישען סאמנאויז ביימער.

אסטמא. צו הארץ-אסטמא איז די רפואה צו שטארקען דאס הארץ מיט קרעפטיגע מאכלים, שווערע אייער, קאזע-בילד ווארעמע, באלד פון די מעלק. עס טרעפט זיך אבער אממנעכטענס הארץ-אסטמא ביי די מענטשען, וועלכע זענען צו פֿעט, און האבען שטארק ביי דעם הארץ, די מענטשען מוזען פֿארען אין אוועקע בעדער וועלכע צעהרען אָב דעם מענטש, דהיינו, מאריענבאר איז זעהר גוט צו דעם. אויב דער מענטש איז נישט אומשטאנד צו פֿאהרען אין א באָד אריין, מוז ער זיך ווענדען צו א דאקטאר, וועלכער זאל איהם דורך מעדיצינען אָב צוהען דאס שטאלץ פון הארץ.

אסטמא. ביי הארץ-אסטמא צו שטארקען דאס הארץ. אפטיק רפואה, צו קיפֿען אין אפטיק דאס קרייטלעך, ריטא herba Ruta פֿעבריהן אויף ווי ס׳איז און צו טרינקען עטליכע מאָל אין טאָג, אויף ווי ס׳איז מיט צוקער.

אסטמא. ביי דאָרף-אסטמא צו שטארקען דאס הארץ. הויזלעך רפואה, צו קיפֿען פֿיאלבליי-קארטון אין סילף, און דאס צו טרינקען עטליכע גלעזער א טאָג.

אסטמא. ביי הארץ-אסטמא גי שטארקען דאס הארץ. הוייליכע רפואה,
צו קאפן צוזאמען א האלב. קוואטירל בוסער, א האלב
קוואטירל גוטען האניג, מיט א גלעזעל קאניאק אדער גוטען בראנפֿען.
דאס צו לאזען אַבקהלען, און צו נעמען פֿון דעם אלע צוויי שעה א
קאוי-לעפֿערע.

אסטמא. צו לונגען-אסטמא דארף מען היילען די לונגען, זי וואָרען
קאָנען אַ-ויסוואַרפען די לחות, וואָס זאמעלט זיך אַהן אינ-
וועניג, דורך דעם ווערען זיי בעסער קאָנען אַרײַן ציהן די לופֿט.
אפּטיק רפואה, צו קײַפֿען אין אפּטיק די קריטעצער, וועלכע רופֿען
זיך „ספּעקציעס-פּעקטאָראַליס“ *Species pectoralis* דאָס צו פֿעבריהן
אזוי ווי מײַ און טרונקען מיט צוקער. מען קאָן אויף צו מײַשען צו
דעם מילך.

אסטמא. צו לונגען-אסטמא. אפּטיק רפואה, צו קײַפֿען אין אפּטיק
„קראַפֿליס-יאַדינא“ *Tr. jodi puri* אַרײַן צו מײַשען פֿינף
קראַפֿלעס אין אַ האַלב גלאָז מילך, און דאָס אויסצוטרינקען אַרבע און
דערפֿריה.

אסטמא. צו לונגען-אסטמא. הוייליכע רפואה, צו טרונקען הייסע
מילך מיט בוסער עטליכע מאָהל מעגליך.

אסטמא. צו לונגען-אסטמא איז זעהר גוט צו מאַכען פֿארעם מיט
א מאַשינקא, אַרײַן צו אַטעמען הייסע פֿארע. עס איז גוט
אַרייַנצוימהן אין דעם וואַסער, פֿון וועלכען עס מאַכט זיך די פֿארע,
פֿון 10 ביז 15 קראַפֿלעס „טערפֿאָנטין“.

אסטמא. צו לונגען-אסטמא. אפּטיק רפואה, צו קײַפֿען אין אפּטיק
דאָס קריטעצער „ליכען-יסלאַנדיקוס“ *Lichen Islandicus* דאָס
צו פֿעבריהן אזוי ווי מײַ, און צו טרונקען מיט צוקער עטליכע גלעזער
א מאָל.



(ב)

בויד. בויכוועהטאג איז פֿערהאנען פֿונפֿערליי מינים, יעדער מין וועהטאג איז די אורזאכע אַנדרער קראנקהייט.

(1) אויב דער בוייד שמערצט אין דער מיט באלד אונטערן, הארץ-גריבעלי, איז די אורזאכע, מאָנען-קראנקהייט.

(2) אויב דער בוייד שמערצט אין דער מיט אונטערן, ארום דעם אָפֿיל, איז די אורזאכע אַנדרערם-קאטאר.

(3) אויב דער בוייד שמערצט אין דער הויף אויף די רעכטע זייט, איז די אורזאכע לעבער-קראנקהייט, אָדער, גאל-שטיינער.

(4) אויב דער בוייד שמערצט אונטערן נעבען די פאָדע אויף די רעכטע זייט, איז די אורזאכע אַ קראנקהייט פֿון די שלעפֿא-קישקע.

(5) אויב דער בוייד שמערצט אויף די לינקע זייט, איז די אורזאכע אַ קראנקהייט פֿון די מילך.

אויסער דעם ביי פֿרויען איז דאָ נאָך פֿיעל אינערליכע בוייד-שמערצען, וועלכע דערנעמען זיך פֿון דער, געבור-מוטער. יעדער קראנקהייט פֿון די אויבערדערמאָנטע קראנקהייטען דארף אנדערע אינער-ליכע רפואות.

בויד. אויסערליכע רפואות צו בויכוועהטאג קאן נאָר זיין הייסע חלאָד-נעס. די בעסטע חלאָדנעס פֿון הויזליכע מיטלען זענען פֿאלגענדע:

(1) אַנצוקאכען גערשטינע גראַפען אויף ווייד. אַבצוגיסען דאָס וואסער. נאכדער צו פרעגלען די געקאכטע גראַפען מיט, חזיר-פֿעטץ. די גרויפֿען ליגט מען אַרײַן אין אַ לייווענטען בייטעל, דאָס לעהנט מען אויף דעם בוייד גוט וואַרעם, אויף דעם אָרט ווי די וועהטאג איז, אויף די חלאָדנע לעהנט מען אַ דינע צעראטקע, אויף די צעראטקע לעהנט מען אַ שטיק וואַס. נאכדער פֿערבאנדזשירט מען. אין עטליכע שעה ארום אז די חלאָדנע ווערט אָבעקיהלט, דארף מען צו לעהנען אַ פֿרישע חלאָדנע.

(2) נאָך אַ מין חלאָדנע קאן מען מאַכען. אַנצוקאכען, ליאני-שעמין מיט וואסער גירעכט. דאָס אַרײַן צו לעהנען אין אַ לייווענטען בייטעל אין צו לעהנען, זאָ ווי אויבען איז דערמאָנט. נאָך בעסער איז צו קאכען דעם ליאני-שעמין מיט מילך, אויב אויף דעם אָרט ווי די וועהטאג איז

ועד ש' מען אביסעל אָנגעשוואַלען, איז גוט אַרײַנצומישען אין דעם ליאָג-
שעסין בשעת אין קאַכען אַ לעפּעלע געשמויסענעם קאמפּאָר.

(3) נאָך אַ מין חלאָדנע קאָן מען מאַכען. צו פראַושען אין אַ מאָפּ
טריקענע וויצענע קליינע, ביז זי וואַלען ווערען גוט הייס. נאָכהער וואַל
מען די קליינע בעשפּריצען מיט גוטען וויין-עסיג, זי וואַלען ווערען
פּיכט. דאָס וואַל מען אַרײַנלעהען הייסע הייס אין אַ בייסעל אַרײַן און
צו לעהגען, און צו פּערבאָדאָשערען מיט וואַס, אזוי ווי אויבען איז
דערמאָנט.

בויד. צו בויכעוועהטאָג און אָבפּירונג מיט גרימעיניש, אפּמייק רפואה,
צו קייפּען אין אפּמייק, וואַלעריאָן "radix Valerian" מיט
מיינעטאָ טי דאָס צו פּעבריהן אזוי ווי טי, און טרינקען עטליכע גלעזער
מיט צוקער.

בויד. צו בויכעווערצען פֿון אַ לופּט-פּערשפּאַרונג, אפּמייק רפואה, צו
קייפּען אין אפּמייק, "קרושינא" cortex Frangulae דאָס צו פּעבריהן
אזוי ווי טי און טרינקען מיט צוקער. ביי דער קראַנקהייט איז ווער
גוט צו מאַכען דעם קראַנקען אַ הייסע וואַנע.

בויד. בויכעוועהטאָג ביי קליינע קינדער, וועלכע ווײַנען נאָך די ברייט.
אפּמייק רפואה, צו קייפּען אין אפּמייק, "פּענעכעל-טי" Foeniculi
דאָס צו פּעבריהן אזוי ווי טי. פֿון דעם וואַל מען געבען דעם קינד צו
טרינקען אלע מאָהל עטליכע לעפּעלעך מיט צוקער.

בויד. בויכעוועהטאָג ביי קליינע קינדער, אויסערליכע רפואה, צו קייפּען
אין אפּמייק גרינעם בוימעהל. אויסצומישען אַ לעפּעל פֿון דעם
בוימעהל מיט אַ לעפּער שפּרייט. דאָס צו דערוואַרעמען, און מיט דעם
אויסצושטירען דעם קינד דאָס בייכעל. פֿון אויבען צו פּערבאָדעווערען
דאָס בייכעל מיט וואַס.

בויד. ביי אַ קראַנקהייט פֿון די, "שלעפּא-קישקא" ווערט על פי רוב
דער קראַנקער פּערמאָכט און האָט נישט קיין שטיי-נאָנג, עס
גורנט און איבעלט איהם צום ברעכען. פֿיער ברעכען ווער מיאס.
ביי דיזען פּערלענעהייט מוז מען זיך ווענדען צו אַ דאָקטער-אַ חירורג.
על פי רוב קומט אויס ביי אַזעלכע קראַנקע צו אָפּערירען, און די
שלעפּא-קישקא ווערט בעווייטגט פֿון בויך אַרויס. די אָפּעראַציע ווען זי
ווערט געמאָכט אין די רייכטיגע צייט איז זי נאָהר נישט געפּעהרליך.
דער מענטש איז נאָך דערנאָך געזונדער ווי דעפּויר, אַלזאָ רופּען זיך

ארויס פֿיעל דאָקטוירים מיט אזא ווייטץ. אז אזוי גוט ווי מען בעזימיגט
בײַ אקדען קינד די ערלה, אזוי גוט וואָל מען עס בעזימיגן באלד די
שלעפּע-קישקא אויך, וואָלט דורך דעם דער מענטש ניצול געוואָרען
גרויסערהייט פֿון פֿיער קראַנקהייטען. מען דארף זיין געוואָרענט אזוי ווי
מען דערקאנט נאָר אין די סמנים אז דער מענטש איז קראַנק אויף די
שלעפּע-קישקא, וואָל מען דעם קראַנקען נישט איינגעבען אויף אַב-
פֿיהרען, נאָר מען וואָל איהם פֿרווען מאַכען לעוואטיוועס. אויף דעם
אַרט ווי די ווייטאָג איז דארף מען באלד לינגען נאָך אַנדער דער
דאָקטער קומט קאָמפרעסען פֿון קאלט וואַסער מיט שפּריט, און אויך
א פֿעקערז מיט אים.

ברומ. אז עס געהט בלוט פֿון דער נאָז. הויזליכע רפואה, אַרײַן צו
שטעקען די פֿיס העכער ווי די קנעכלעך אין קאלט וואַסער.
אַדער מען וואָל איינטינקען אין קאלט וואַסער א שוואַם אָדער א שטיק
וואַט, און מען וואָל דאָס אַרויפלעהגען ווי דאָס גריבעל פֿון קארעק
איז. דער מענטש וואָס האָט די טבע אז עס געהט איהם אלע מאָהל
בלוט פֿון דער נאָז, דארף זיך ווענדען צו אַ נאָז-דאָקטאָר ער וואָל
איהם בעטראַכטען אויב ער האָט נישט קיין פֿאָלפּ אין די נאָז.

ברומ. אז עס געהט בלוט פֿון די לינגען דורכ'ן האַלז. צו דעם
קראַנקען מוז מען באַד רופֿען אַ דאָקטאָר. ביז דער דאָקטאָר
קומט דארף מען דעם קראַנקען לעהגען מיט'ן פֿנים קעפּיר, צו קאָפּענס
וואָל זיין הויף מען וואָל נישט לאָזען רעדען דעם קראַנקען. אויף דער
ברוסט פֿון קראַנקען וואָל מען צו לעהגען קאַרטע קאָמפרעסען. מען וואָל
איהם געבען צו שלינגען קליינע שטיקלעך אייז. מען וואָל איהם געבען
אלע מאָהל אַלעפֿעל וואָל-וואַסער און אַ לעפֿעל קאַרטע לימאָנאָדע.

ברומ. דער וואָס געהט איהם אלע מאָהל בלוט פֿון האַלז, דאָס
איז אַ סימן אז די לינגען זענען בײַ איהם קראַנק. ערשטענס
דארף דער קראַנקער זעהר נויטיג צו זיין אויף פֿרישע לופֿט אין אַ
וואַלד פֿון סאָסנאָיע בוימער. צווייטענס דארף מען איהם שטאַרק אַב-
הימען מיט גוטע עסענס, אַסמיינסענס פֿעטע מאַכלים. ער וואָל
טרינקען קאָזע-מילך וואַרעמע גלייך פֿון דער מעלעק. ער וואָל טרינקען
הייסע מילך מיט בויטער. ווינטער וואָל ער טרינקען פֿליש-טראָהן. און ווען
עס איז די צייט פֿון ווינטרויבען, וואָל ער עסען פֿיער ווינטרויבען.

ברוט. צום בלוט פון די לינגען. אפטמק רפואה, צו קויפֿען איין אפטמק אוועלעך שטיקלעך האַלץ, וועלעך רופֿען זיך וויסקום אלבאָם *Viscum album* דאָס זאָר מען קאָלען מיט מילך, און דעם קראַנקער זאָר טרונקען אלע טאָג אוועלעך 3 גרעסער מילך.

ברוט. איינצוהאלטען בלוט פון אַ שניט איז אַ רפואה, צו ברענגען קופֿער-וואַסער ביז עס זאָר ווערען רויטליך. דאָס זאָר מען צורעכען און אַרויף שוטען אויף דעם אָרט ווי דער שניט איז, אויף דעם זאָר מען פֿערבאנדענערען מיט אַ מיכל, וועט זיך דאָס בלוט באַרד שטעלען.

ברוסט. עס טרעפט זיך פֿיעל מאָהל ביי די פֿרויען-ווינגערס, וואָס אַ ברוסט ווערט פֿערהארטיוועט, און די מילך ווערט איינגעזונג געזעצט און פֿערהארטיוועט. אז מען הויבט נישט אָהן באַרד צו היילען ווערט די ברוסט אלע מאָהל מער פֿערהארטיוועט און עס מאַכט זיך איינזונג אַ אַנצידונג מיט אייטער. די יסורים זענען ווערד שרעקלעך ביז עס קענט זיך פון זיך זעלבסט, אָדער מען ווענדעט זיך צו אַ דאָקטאר אַ חירורג, וועלעך אָפֿערירט די ברוסט. די אלע צרות קומען אַרויס, וואָס מען הויבט נישט אָהן באַרד אַנצונעמען קיין מיטלען קענען דעם וואָס די ברוסט הויבט אָהן פֿערהארטיוועט צו ווערען.

ברוסט. די ערשטע הויפט מיטלען, נישט צו צולאָזען קיין אַנצידונג אין די ברוסט בעשטעהט פון צוויי פונקטען. (1) ווייך צו מאַכען די ברוסט דורך הייכע קאָמפרעסען, הייסע חלאָדנעס מיט עטל וואַלבען, וועלעך העלפֿען ווייך צו מאַכען די ברוסט. און דורך דעם געהט געלעך די מילך אַרויס, דאן קאָן זיך שוין נישט מאַכען קיין אַנצידונג. (2) מען דארף זעהן אָב צו ציהן די מילך מיט וואָס נאָר מעגליך איז. אויב דאָס קינד וויל נישט זיינען, זאָר מען שאַפֿען אַ קליין הינדעלעך אָדער אַ קליין קעצעלעך וועלעך האַלטען ביי זיינען, וועלען זי גוט אויסזיינען די געזעצטע מילך. אויב מען קריגט דאָס נישט, זאָר מען מיט אַין אַבציהר אָבצירן די מילך. דאָס דארף מען אלס טוהן באַרד אין אָנהויב.

ברוסט. די אויסענוועהניגסטע מיטלען ווייך צו מאַכען די ברוסט זענען פֿאַלגענדע.

(1) צו שטירען די ברוסט מיט וואַרעמען רצין-געהל און אַרויף צו

לזה ען א ווארעמען קאמפרעס. אויפ'ן קאמפרעס א דינע צעראמקע.
אויף די צעראמקע וואל מען פארבאנדענערען מיט וואס. אלע 2 טעה
וואל מען פריש געדענקען דעם זעלבע.

(2) אַנצוקאָלען קארטאָפֿלס. די קארטאָפֿלס וואל מען גוט צורייבען
און איבערפֿרעגלען מיט גענוג חור-פֿלעג. דאָס וואל מען הייטערהייט
אריין לעהנען און א לייווענמען בייטעל און ארום לעהנען הייט אויף
די ברוסט. אויף די חלאָדנע וואל מען ארום לעהנען מיט וואס, עס וואל
האלטען לאנג היץ. און מען וואל אזוי פֿערבאנדענערען.

(3) אַנצוקאָלען געשטויסענעם, ליאני-שעמין צוזאמען מיט, פֿענעכעל-
טוי Foeniculi אין מילך. עס וואל ארויסקומען געדעכט. דאָס וואל מען
הייטערהייט אריין ליגען אין א בייטעל און ארום לעהנען הייט אויף די
ברוסט, און צו פֿערבאנדענערען אזוי ווי איבען דערמאנט איז.

(4) אַנצוקאָלען, פֿענעכעל-טוי Foeniculi מיט ווייטצען-מעהל און
מילך, עס וואל ארויסקומען געדעכט, און פון דעם וואל מען צו לעהנען
הייטע חלאָדנעם, אלץ אזוי ווי איבען דערמאנט איז.

(5) אויב מען זעהט אז איינער דעם וואס די ברוסט איז פֿע-
הארטיוועט, הייטע זי אהן געשוואלען צו ווערען, וואל מען צו לעהנען
הייטע חלאָדנעם פון געשטויסענעם ליאני-שעמין געקאכט אין מילך, און
מען וואל צו טוהן בשעת אין קאכען אביסעל געשטויסענעם קאמפֿאר.
אזעלכע חלאָדנעם וואל מען צו לעהנען אלע 3 טעה א פֿרושע הייטע
חלאָדנע און פֿערבאנדענערען, אזוי ווי איבען דערמאנט איז, ביז די
ברוסט וועט זיך עפענען. נאכען עפענען וואל מען די ברוסט איינזוקען
אין א שויסעל בור-ווייערע-חאסער, עס וואל זיין גוט ווארעם, נאכהער מוז
מען נעמען א גוטען פֿעלדשער, ער וואל מאכען אלע טאג אפאמרונקעס.
ברוסט. אויב די ברוסט איז שוין גוט אָנגעצויגען מיט אייטער, די
שמערצען זענען גרויס, און עס וויל זיך נישט אריין עפענען.

און קיין דאקטאר בעקומט מען אויף נישט וואס וואל אויף האקען די
ברוסט. וואל מען נעמען א ציבעלע און גוט צורייבען זי אויף א "ריב
אייזען", און מען וואל נעמען א בייטעל שיטערען גרינעם וויף מיט
א בייטעל הייטע-שמאלץ. אז מען בעקומט נישט קיין האָזען-שמאלץ וואל
מען צו מישען אביסעל האָנג. דאָס אלץ וואל מען ביי דעם פֿיער דער-
ווארעמען גוט, און אויסצומישען גוט אלס צוזאמען, ביז עס וואל ווערען
אזוי ווי א גערעכטע וואל. מיט דעם וואל מען אָנשמירען אויף א מיכעל,

און מען זאל צולעהגען אויף דעם ארט ווי עס דארף זיך עפענען. פון
אויבען זאל מען ארויפלעהגען וואס אין מען זאל פערבאנדעזשירען.

בריה. צו א בריה פון פֿייער, אויב דער בריה איז נישט אזוי שטארק
אז ער האט באלד געמאכט א ראנע, נאך עס איז געווארען
א רויטער ציכען, איז גוט באלד ארויף צו לעהגען אקעוויט אויסגעמישט
מיט זאלץ. דאס ציהט אויס דאס פֿייער. אויף איז גוט ארויפצושטען
אויפֿן בריה פֿיעל מרינק-סאדע און צו פֿערבאנדעזשירען. די רפואה איז
גוט צו א שטארקען בריה אויף.

בריה. צו א בריה פון פֿייער. אפטמק רפואה, צו קיפֿען אין אפטמק
„פלין-באראווי“ Ligu Burovi דאס אויסצומישען מיט פֿריש
פֿיכט ליים און אויסצוקעמען אזוי ווי א טינגעל. אזעלכע שטיקלעך ליים
זאל מען צו לעהגען צום בריה, אלע מאהל א פֿריש שטיקעל ליים.

בריה. צו א בריה פון פֿייער, אפטמק רפואה, צו קיפֿען אין אפטמק
„גאלערדאווי-וואסער“ Woda Golerdowa און פֿון דעם זאל
מען צו לעהגען קאלטע קאמפרעסען צום בריה. די קאמפרעסען זאלען
זיין פֿון גאזע, אדער פֿון א ריין שטיקעל לייווענד.

בריה. אויב די מיטלען האבען נישט געהאלפֿען ארויס צו ציהען
אינגאנצען דעם בראנד און עס האט זיך געמאכט ברען-בלאזען
מיט ראנעס. דארף מען אנהויבען היילען מיט זאלבען. אפטמק רפואה
צו קיפֿען אין אפטמק „לינימענט-קאלקס“ Linim Calcis דאס אָנצו-
שטירען אויף א טיכעלע און מען זאל צולעהגען אויף די בלאזען מיט
די ראנעס.

בריה. צו א בריה, א הויזליכע זאלב. מען זאל נעמען שטיקלעך קאלעך
אומגעלאשענעס און אריין לעהגען אין א שטיקעלע. אויף דעם
קאלעך זאל מען ארויפגיטען וואסער גענוג, דער קאלעך זאל זיך אָב-
לעשען, און עס זאל נאך בליבען וואסער העכער ווי דער קאלעך. אין
א 2 שעה ארום וועט שוין זיין אויף דעם וואסער א וויס היטעל. דאס
היטעל זאל מען אראפגעמען מיט א בלעכענעס לעפֿעל, און מען זאל
דאס אריינשווהן אין א גלעזעל. צו דעם זאל מען צומישען אביסעל לאב-
עהד און מען זאל דאס גוט אויסמישען. פון דעם זאל מען אָנשטירען
טיכעלעך און צולעהגען.

בריה. צו א בריה, א הויזליכע זאלב. מען וואל נעמען א עס-לעפעל לאנג-עהל, און אריינגעסען אין א גלאז אריין. און מען וואל נעמען א וויסלעכץ פון א פריש היגענערען איז און מען וואל עס נומ צו קראפען, נאכהער וואל מען דאס אריינטוהן אין דעם גלאז צו דעם לאנג-עהל. די בירע זאכען וואל מען נומ אויסמישען. אין דעם וואל מען איינגעגען טיכעלעך און צולעהגען.

בריה. צו א בריה. א הויזליכע רפואה. באלד נאכץ בריה צו נעמען א געלעכץ פון א פריש היגענערען איז, מיט דעם אַנצושטירען א שטיקעל אפטיק וואס, און באלד דאס ארויפצולעהגען אויפ'ן בריה און נומ צו פערבאנדאזשירען. ציט עטליכע שעה איז דער בריה אויס-געהילט. די וואס וואל מען איינגעגען מיט ווארעם וואסער און אראב נעמען.



(ג)

גיפט. עס פערלויפט עך פיעל מאהר אז מעגשען ווערען פערגיפטעט, אדער אומגערען, אדער גערענוויליג, ברי פטור צו ווערען דאס לעבען וואס איז איהם פערמאנסט געווארען. די סימפטאמען פון גיפט זענען פארגענדע: ברעכען, לאקסירען, שרעקליכע שמערצען אין מאגען און אויך אין בויך. דער קערפער ווערט קיחל, און ווערט בא-דעקט מיט א קאלטען שווייז. דער קאפ און דאס מויל מיט די צינג-ברענגען שטארק און עס גיסט זיך פון מויל א מין פליסיגקייט און שאם. דאס פנים איז שטארק רויט אדער בלאה. דער אטהעם ווערט ארע מאהל שווערער, און ער פאלט אלע מאהל אין חלשות. אויב מען זעהט ביי א מענטש אפילו נאר עטליכע פון די סימנים אז זי זענען אַנגעקומען פלוצלונג, איז דאס א בעווייז אז דער מענטש איז פערגיפטעט געווארען. **גיפט.** קענען יעדען מין גיפט געפונען זיך אפטיק מיטלען, וואס זענען א געגען-גיפט. אזוי ווען מען וואל גענוי וויסען מיט וואס דער

מענש איז פֿערגיפֿטעט געוואָרען, און ווען מען זאל באַלד האָבען אַ דאָקטאָר מיט די נויטיגע געגען-גיפֿט מיטלען, וואָלט קיינמאָהל קיין מענש נישט געשטאַרבֿען פֿון גיפֿט. דאָס אומגליק איז אָבער שטענדיג וואָס אַמאָהל ווײַסט מען נישט וואָס דער גיפֿט איז, און אַמאָהל זענען די מיטלען פֿון געגען-גיפֿט נישט צו געקומען באַלד, און אַמאָהל קומט נישט באַלד דער דאָקטאָר. אַלזאָ דארף מען בײַ אַזעלכע וויכטיגע און געפֿעהרליכע מאַמענטען נישט צו וואַרטען אויפֿן דאָקטאָר, נאָר קודם פֿל זאל מען דעם אומגליקליכען מענש אַליין באַלד אָנהויבען צו ראַטעווען.

גיפֿט. במעט בײַ אַלערליי גיפֿטען (אויסער וויטריאל, שנייד-וואַסער, זאלץ-ווערע, עססיג אַעססענציאַ) איז ערשטענס די הויפט-רפואה אויס צו רייניגען דעם מאַגען מיט די געדערם פֿון דעם גיפֿט דורך ברעכען און קלינסירען. נאכהער צו לעשען דאָס פֿייער וואָס ברענט אין מאַגען מיט די געדערם פֿון דעם גיפֿט דורך קאלטע געטראַנקען און דורך אַפּפּיק-מיטלען וואָס דער דאָקטאָר פֿערשרייבט. אויסער דעם דארף מען זעהן דער קראַנקער זאל האָבען ריינע פֿרושע לופֿט, און מען דארף דעם קראַנקען אַלע מאָהל צו דערקוויקען מיט געשטאַק-טראַפענס. מען דארף נישט לאָזען דעם קראַנקען פֿערחלשט צו ווערען דורך דעם וואָס מען זאל אַלע מאָהל רייבען מיט אַ האַרטליכע בערשט די הויט פֿון זײַן ליב און אויף די פֿאָדעשוויס פֿון די פֿיס, און דאָס פֿנים זאל מען אַלע מאָהל בעשפּריצען מיט קאלט וואַסער.

גיפֿט. די הויזליכע מיטלען צום ברעכען זענען, מען זאל אויסמישען וואַסער מיט צוקלאַפּטע ווייסלעכצער פֿון אייער, און דאָס זאל מען אין איהם אריינגיסען ווי ווײַט מעגליך איז.

ברי צו לעשען דאָס פֿייער וואָס ברענט אינוועהנוג, זאל מען איהם געבען צו טרינקען קאלטע מילך. מען קאָן צו די קאלטע מילך אויף צו מישען אַביסעל צוקלאַפּטע ווייסלעכצער פֿון אייער מיט אַביסעל גאָר דיין צושטויסענעם צוקער. אויף דארף מען אַנקאָכען מילך מיט ווייטצען-מעהל, עס זאל זײַן שיטער, און דאָס זאל מען געבען דעם קראַנקען פֿיעל מאָהל צו טרינקען. עס זאל נישט זײַן הייס נאָר עטוואָס לאָה, נאכהער אז דער קראַנקער איז שוין געקומען עטוואָס צו זיך. זאל מען איהם געבען צו טרינקען קאלטע לימאָנאָדע, און אויך סעלטער-וואַסער מיט מילך.

גיפמ. די קליסמירען זאך מען מאכען פון ווארעמי מילך, געמישט מיט בוימעהל, אדער מיט לאני-עהל, אדער מיט אומגעזאלציגע בומער. אדער מען זאל אנקאכען לאני-שעמין מיט וואסער, אזוי אז דאס וואסער זאל ווערען געדעכמליך, דערנאך זאל מען דאס וואסער אבזיען, ראזען אויסקהלען, און פון דעם זאל מען מאכען די קליסמירען. צו דעם לאני-שעמין וואסער איז אויך גוט צו צומישען אבוסעל בוימעהל אדער לאני-שעמין עהל. אויך איז גוט צו מאכען די קליסמירען פון קאמיללען-טח געמישט מיט בויס-עהל אדער מיט לאני-שעמין עהל.

גיפמ. צום בויף איז גוט צו צולעהגען ווארעמע חלאדגעס, אדער ווארעמע קאספרעסען. אויב דער קראנקער ברעכט צו פיעל דארף מען צולעהגען קאלטע קאספרעסען אויפ'ן מאגן, דאס הייסט אונטער'ן הארץ-גריבעל.

צום קאפ דארף מען צולעהגען קאלטע קאספרעסען פון וואסער מיט עסיג. וועגען דעם צו מען זאך צולעהגען צום קאפ א בלאז מיט אייז, קאן מען יך נישט אהין מעכטיגען, נאר מען מוז וועגען דעם אג-פרעגען א דאקטאר.

צו די לידקעס פון די פיס, דאס הייסט ווי דאס דיקע פריש איז, פון אונטער די קניעהן ביז אראב, זאך מען צולעהגען גארטשניצא, זאך דארט ליגען אזוי לאנג ביז עס ציהט גוט אן א רויסקיט.

גיפמ. אויב דער גולט איז וויטריאל, שיד-וואסער, זאך-ווייערע אדער עסיג-עססענציא, מאהר מען אהין קיין דאקטאר נישט געבען צו ברעכען, נאר מען זאך אין איהם אהין גיסען פיעל קארט וואסער, אדער פיעל קאלטע מילך. אויך איז גוט מען זאל צו שטריכען קרייז דין ווי מעהל, און מען זאך דאס איבערוועפן און אויסמישען מיט וואסער אדער מיט קאלטע מילך, און דאס זאך מען געבען דעם קראנקען צו טרינקען. וויטער מיט די איבריגע רעמונג-מיטלען זאל מען מוהן אלס אזוי ווי אויבען בעשרובען איז געגען ארע אנדערע גיפטען.

גיפמ. אויב עס איז געלונגען אב צו ראטעווען דעם אומגליקליכען מענש, דארף מען איהם אפהיטען דערנאך א יאנגע צייט פון שווערע מאכרים, איבער דעם שוואכקייט פון מאגן און פון דער מאגן-רעהר, ווי עסען דארף נאר ווי מילך, וופ, יך, גריפעה און אסאך עסוואס א ווייך שטיקעל זעמעל.

געבור-מוסער. די געבור-מוסער ביי פרויען קאן שלאף ווערען אויף פיעל שלאפֿקייטען. און בעווייל דאס איז א איבעררודי

שראפֿקייט, וועלכעס מוז אונטערנעזוכט ווערען דורך א „מוסער-שפיגער“ איז גרייכער מיט פרויען-קראנקהייטען צו ווענדען זיך בארד צו א „אקווער-דאקטאר“. דאך מוז מען דא שרייבען עפעס רפואות, פאר די ארעמע קלאסען מענשען, וואס זענען נישט אומשטאנד צו קורירען זיך ביי א דאקטאר, דעס גרייכען פאר די איינוואהנער אין די ערטער ווי קיין דאקטאר געפינט זיך נישט.

געבור-מוסער. אויב די געבור-מוסער האט געקריגען א קאסאר, און זי איז געווארען אנגעשווארען און אפגעל פער-הארטעוועט. איז גוט צו מאכען צוויי מאהל טעגליך שפריציוואניס מיט א „רינאטור“. איינמאל מיט „בור-זויערע“, און איינמאל מיט „דעמבאווי-סקורע“, וועלכע ווערט געקאכט אין וואסער, ביז דאס וואסער ווערט רויט, דאן נעמט מען עס איבער דורך א סוה. און ווען עס קוהלט זיך עטוואס אן, זאל מען מאכען מיט דעם רויטען וואסער די שפריציוואנע. **געבור-מוסער.** אויב די „געבור-מוסער“ פליסט מיט געלע ברענגע-דיגע אפלאוועס, דארף מען מאכען צוויי מאהל טעגליך שפריציוואניס, איינמאל מיט „בור-זויערע“, און איינמאל מיט א צוויי לעפערעך „טרינק-סאדע“ *Natr. bicarbonici* אויף פיער גלעזער דאך וואסער.

געבור-מוסער. צו אפלאוועס. הויזליכע רפואה, צו קאכען האפען, וועלכעס ווערט בענוצט צום ביער מאכען. דאס קאכט מען אזוי ווי ס׳, און מען טרינקט עטליכע גלעזער אלע טאג מיט צוקער.

געבור-מוסער. אויב די פרוי שפיערט גרויסע שמערצען, ווען דער רעגאל קומט אן. אפטמאל רפואה, צו קויפֿען אין אפטמאל דאס קרייטעכץ „ראזמארין“ *Fol Rosmarini* דאס זאל זי פערבריהן אזוי ווי ס׳. און טרינקען אזוי ווי ס׳ מיט צוקער.

געבור-מוסער. די פרוי וואס האט א טבע, ווען דער רעגאל קומט אן, אז עס געהט פֿון איהר צו פיעל. איז אויך גוט דאס זעלבע קרייטעכץ „ראזמארין“ זאל דאס ווייזען אין גומען בראנפֿען, און אלע 3 שעה נאך זי פֿון דעם טרינקען א בראנפֿען-גלעזעל.

געבור-מוטער. איינצושטילען דאס געבלוט. הייליכע רפואה, זי
זאל טרינקען אין דער פריה נאכטערן א ווייטערעכץ
פֿון א רייה איי, אויסגעמישט גוט מיט קאניאק, אדער מיט גוטען שמארקען
בראנפֿען.

געבור-מוטער. איינצושטילען דאס געבלוט. אפטמיק רפואה, צו
קויפֿען אין אפטמיק דעם קארוען, "ראדוקס-ארטעמיזיא
radix Artemisiae און אויך אזא הארץ, וואס עס רופט זיך אין אפטמיק
"וויסקום-אלבום" Viscum album די בידע צו קאכען צוזאמען, און דאס
וואסער צו טרינקען בערך דריי גלעזער א טאג, אזוי ווי ס'זיין מיט
צוקער.

געווינערין. יעדער פֿרוי אז זי רעכט זיך קינדבעטערען צו ווערען
זאל זי מאכען צופֿויר א ווארעמע וואנע. די פֿרויען וואס
האבען שווער קינדער זאלען זיך מאכען צופֿויר עטליכע מאהל וואנעס.
און אויב זי האבען נישט אלע טאג קיין שטיי-גאנג, זאלען זיי איינגעמען
עפעס פֿון די גרינגע מיטלען, זאלען יא האבען אלע מאָג א שטיל-גאנג.
געווינערין. אויב דאס געווינען געהט שווער צו, איז דאס גלייכסטע
פֿון אלעס צו ווענדען זיך צו א אקושער-דאקטאָר, און
אויב דער דאקטאָר זאגט אז מען מוז דאס קינד אָנגעמען מיט קליינעסעס,
זאָר מען נאָר נישט ווארעמען נאָר מען זאל באַלד ערלויבען דאָס דעם
דאקטער. וואָרען מיט דעם קאָן מען דערהארטען דאָס רעכען ס'פֿון
די געווינערין און ס'פֿון דעם קינד. און אויב נישט, פֿארשטעהט זיך,
אז דאָס קאָן ברענגען פֿארקעהרט. דא ווי מען בעקומט נישט קיין
עלכען דאקטאָר, זאל מען זעהן צו נעמען האַטש א גוטע אקושערקא,
וועלכע זאָר קאָנען פֿערשרייבען פֿאר די געווינערין פֿראַשקעס, "ספֿאַרישטש"
פֿון דער אפטמיק. פֿון הייליכע מיטלען איז גוט צו מאכען א גלאָז
צוקער-וואסער, מען זאל צולאָזען 5 לויט צוקער אין א גלאָז וואסער,
און מען זאל די געווינערין געבען אלע מאָהל צו טרינקען פֿון דעם
וואסער. אויך זאל מען איהר געבען אלע 10 מינוט א לעפֿעל גוטען און
שמארקען ווין.

געלייזוכט. לויט דאקטער'ס איז דאס א גאר-קראנקהייט. אפטיק

רפואה, צו קויפן אין אפטיק 4 לויט קריטעכץ, "הער-

בא צוקאריים-ינטיבוס" herba Cichorium intibus. 4 לויט קריטעכץ, "הערבא-

היפעריוקום-פערפאראטום" herba Hipericum perforatum. 2 לויט קריטעכץ

הערבא-חעלידאני" herba Chelidoni. די 10 לויט קריטעכצער זאל מען

אויסמישען צוזאמען, און פון דעם זאל מען פאבריהען ביסלעך אזוי ווי

מ"י. דאס זאל דער קראנקער טרינקען אלע מאָג בערך דריי גלעזער.

געלייזוכט. אפטיק רפואה, צו קויפן אין א ריעלע אפטיק ריכטיגען

שפיגנאר-עהל. אויף ליטין רופט ער זיך "אהל-לעוואנדולי"

oln Levanduli. פון דעם עהל זאל מען אריינמישען 5 קראפלקס אין א וויין-

גלעזעל מיט וויין. און דאס זאל דער קראנקער אלע אין דער פריה

אייננעמען.

געלייזוכט. הויזליכע רפואה, איינצומינקען א שוואם אדער א נשמן

וואס אין קיה-מילה, בארד נאך דער מעלק ווען די מילה

איז נאך ווארעם. און מיט דעם זאל מען איבער ווישען דאס גאנצע

לייב פון דעם קראנקען אלע מאָג.

געשווייער. הויזליכע רפואה צו א געווענהליכען געשווייער אין א האַנגי-

מינגעל. מען פערקנעהט אבנסעל ווייטצען-מעהל מיט

בינען-האַנגי, און מען מאכט דערפון א ווייך טייגעל אזוי ווי א פלעצעלע,

און מען לעהנט דאס צו צום געשווייער. אין פיער פאלען גיבט דאס

גאנץ גוטע רעזולטאמען. עס נעמט צו די ווייטונג, עס מאכט ווייך דאס

געשווילעכץ, עס עפענט דעם געשווייער און עס פעהילט איהם אויך.

מען קאן אויך מאכען פון א שטיקעל שווער סמאלע אזוי ווי א טייגער

און מען זאל עס צולעהגען צום געשווייער אזוי ווי א האַנגי-טייגעל.

געשווייער. ווייך צו מאכען א געשווייער, אז ער זאל זיך זעלבסט

עפענען. אפטיק רפואה, צו קויפן אין אפטיק א שטיקעל

"מערילאטין-פלאסטער" Emplast rum melloti און מען זאל אַנשטירען אויף

א טיכעל און צולעהגען. אויף דעם טיכעל זאל מען ארויף לעהגען א

שטיקעל וואס אין מען זאל פערבאנדעושיקען מיט א טיכעל.

געשווייער. דא ווי דער געשווייער האט זיך פערנומען גרויס, און עס

האט זיך געמאכט א מכה מיט אייזער. די שמערצען זענען

גרויס, בעיוויל עס וויל זיך נישט זעלבסט אזוי גיך עפענען. אויב מען זעהט אז עס איז שוין דאס צום עפענען, זאל מען זיך ווענדען צו א דאקטאר אדער א פערשער, מען זאל דאס אויפהאקען. ווארען לאנג צו ווארטען מיט אזא מכה איז נישט געוונד פאר'ן גאנצען קערפער. דא ווי מען קאן נישט גרייכען צו א דאקטאר זאל מען זיך בעניצען מיט הייליכע מיטלען. מען זאל נעמען א ציבעלע, און מען זאל זי גוט צו-רעכען אויף אר באזינען. און מען זאל נעמען אביסעל שווערען גרינעס ים מיט גלייכעל האנג אדער מיט א שמוקעל האזען שמאלץ, וועלכעס מען קריגט אין אפטיק. דאס זאל מען עטוואס איבערפריגעלען אויפ'ן פער, און מען זאל עס גוט צורייבען, עס זאל ווערען אזוי ווי א זאלב. די זאלב זאל מען אנשמירען אויף א טיכעל און צולעהגען אויף די מכה, וועט עס זיך עפענען.

געשווייער. אז דער געשווייער האט זיך שוין געעפענט. עס געהט איינער און מען דארף איהם היילען. דארף מען ערשטענס אפצורייניגען גוט אלע מאג מיט אביסעל ווארעמע קארבולאון-וואסער, און מען זאל צולעהגען א זאלב. מען קאן זיך אויך בעניצען מיט א הייליכע זאלב. מען זאל צולאזען אויפ'ן פער אלעפער אומגעזאלצענע פרישע בומער, צו דעם זאל מען צוגעבען א געלעכץ פון א פריש הונדערען איי, ווען ד' בומער איז נאך גוט ווארעם נישט קאכענדיג. מען זאל דאס צומישען און לאזען אפגיחלען, וועט פון דעם ווערען א זאלב. די זאלב זאל מען אנשמירען אויף א שמוקעל לייוונט ווייכע און ריינע, און דאס זאל מען צולעהגען צום געשווייער 2 מאל טעגליך.

געשווייער. דער מענטש וואס עס שלאגט איהם ארויס אויפ'ן ליב אלע מאל געשווייער אדער קרעצלעך, דארף נעמען מיטלען צו רייניגען דאס געבלוט. הייליכע רפואה, איינצונעמען אלע מאג אין דער פריה פון 5 ביז 10 קראפלטעס טערפאנטין אויף טייל. אויסער דעם זאל ער זעהן צו האפען אלע מאג א שטיל-גאנג.

געשווייער. צו געשווייער און ראנעס, וועלכע האבען זיך געמאכט אויף א גליד דורך אפפרינג. א הייליכע זאלב, מען זאל צולאזען אויפ'ן פער וואס, צו נעמען א קעפלעל הייסן שווערען וואס און אריינצוגיסען אין א גלאז אריין, אדער אין א ריין שוועלע. צו דעם זאל מען צו מישען גוט א קעפלעל לאנג-עה. נאכהער זאל מען

צו מיטשען א געלעכץ פון פרושע היגענע אהער. דאס אלס צוזאמען
נוט אויסצומישען, ביו עס וועט ווערען אזוי ווי א זאלב. און מיט דעם
זאך מען שמירען די ראנעס 2 מאהל טעגליך, און מען זאל פערבינדען
מיט א ריין און ווייך טיכעל.

געשוויינער. א הייליכע זאלב צו קלינע געשוויירען אדער קרעצלעך,
מען זאל אויסמישען א לעפעל גומען פראנצואנס-בוימעהל
מיט א געלעכץ פון א פריש היגענע אה. אין דעם זאל מען אריינמישען
א לעפעל „גלייט“ מיט א לעפעל „בלייזיס“. דאס אלעס זאל מען צו-
זאמען נישט אויסמישען ביו עס וועט ווערען אזוי ווי א זאלב. און מיט
דער זאלב זאל מען שמירען 2 מאהל טעגליך. אויב מען בעקומט נישט
קען פראנצואנס-בוימעהל, קאן מען אויף דעם ארט זיך בעניצען מיט
פרישע אומגעזאלצענע ווארעמע בוטער, אדער מיט שטיקטאנקע.

געשוויירעכץ. צו אנגעשווילעכץ אין א גליד נישט פון קיין קלאם,
אפטמיק רפואה צו שמירען מיט קאמפאר-עהל
oli camphor, 2 מאהל טעגליך, און צו פערבאנדענען מיט וואסטי.
געשוויירעכץ. צו אנגעשווילעכץ אין א גליד פון א קלאם, אפטמיק
רפואה צו קליינען אין אפטמיק „ארניק“ Flor arnicae
דאס זאל מען פאברירן אזוי ווי מיי, און לאזען דעם סענץ אבקוהלען,
און פון דעם זאל מען צולעהגען קאלטע קאמפרעסען.

געשוויירעכץ. צו אנגעשווילעכץ, אפטמיק רפואה, צו קליינען אין
אפטמיק באראווי-פליין Liqn Burowi פון דעם זאל מען
אריין מיטשען א לעפעל אין א הארב גלאז וואסער, מיט דעם זאל מען צו-
לעהגען אויף דעם געשוויירעכץ קאלטע קאמפרעסען.

געשוויירעכץ. צו אנגעשווילעכץ מיט וועהמאג אין א גליד. הייליכע
רפואה, צו נעמען דעם קארען וואס מען רופט
איהם „וואקאשין“. מען בעקומט דאס אין אפטמיק אויף. מען צו שניידט
דאס אויף קלינע שטיקלעך און מען פרעגעלט עס מיט חויר פערמין.
דאס קעהנט מען אריין אין א לייווינשען בייטעל, און מען קעהנט צו
הייסע חלאדנעס.

געשוויירעכץ. עס טרעפט זיך ביי קראנקע וואס ליידען אויף א גליד-
קראנקהיט, אזוי ביי זיי ווערט אנגעשוואלען דער בויך

אין די פנים. ביז אזא פארלעגענהייט טוז מען זיך ווענדען צו אדאקטאר,
ער וואל היילען די נירען-קראנקהייט, דאן וועט שוין דאס געשווינדעכץ
אלען אפגעהן.

געשלעכץ קראנקהייטען. אדער ווי דאקטוירעס רופען זיי מיט
דעם נאמען „ווענערישע קראנקהייטען“
זענען פֿערהאנען פֿיער מינים.

(1) פאללוציע.

(2) טריפער.

(3) שאנקער.

(4) סיפיליס.

פאללוציע הייסט, אז די נאטור-קראפט געהט זעלבסט אהן פֿון
מענטש ביינאכט און שלאף. דאס זעלבע קאן אמאהל זיין און איהן נאכט
עטליכע מאהל.

טריפער הייסט, אז עס טריפט פֿון מענטש נישט דוקא ביינאכט
נאר אפילו בייטאג איד.

שאנקער הייסט, אז עס מאכט זיך דורך דעם אומריינעם פֿלויסענקייט
א בייזער געשווער אויף דעם געשלעכטס גליד, פֿון וועלכען עס גיט
מאטעריע און עס פֿערשטאפט דעם קאנאל, וועלכעס עס פֿערשאפט
דעם מענטש שרעקליכע שמערצן.

סיפיליס הייסט, אז עס מאכט זיך ביי דעם מענטש אויפֿן גאנצען
קערפער, אלע מאהל איד א אנדער ארט, פֿערבארנענע טיעפע קרעץ,
וועלכע עס איז זעהר שווער אויסצוהיילען. דער סיפיליס קאן זיך ציען
יאהרען לאנג, און קאן גרינג ברענגען דעם טוירט אויף דעם מענטש.
ביי די אלע פֿיערליי קראנקהייטען איז נאר נישט צו ווארמען.
נאר באד זיך צו ווענדען צו א ספעציעלען ווענערישען דאקטאר,
וועלכער קאן נאר בעצייטענס פֿערייכמען די קראנקהייט. די לעצטע
דרב קראנקהייטען געפֿונען זיך ביי פֿרויען, אזוי גוט ווי ביי מאנספֿערוואנען.



(ד)

דאָר. אז א קליין קינד בעקומט דין דאָר, וועלכעס מען רופט מוחאָממעס, דאָס איז אַ ניפֿערליכע קראַנקהייט. קיין זיכערע ספעציעלע רפואה צו דער קראַנקהייט וועט מען נאָך די דאָקטוירים נישט דערנאָנגען. דאָך איז גלייכער ביי דעם צו ווענדען זיך צו אַ קינדער-דאָקטאָר וועלכער גיבט ווי געווענליך פֿערשידענע רפואות, וואָס דער ציעל זייערער איז נאָר צו קרעפֿטיגען דאָס קינד.

דאָר. הויזליכע מיטלען צו דעם איז נאָר צו באַדען דאָס קינד אין פֿערשידענע בעדער. דהיינו, היי-פראָך בעדער, בעדער פֿון געקאָממענע ניסען-בוימער בלעטער, בעדער פֿון שעפֿסענע-פֿיכלעך-ווייך, בעדער פֿון ווייטציגע קלייען, שוואַכע זאלין-בעדער. אויב דאָס קינד ווירט נאָך זאל מען ענדערען די מילך. אויב מען קאן נישט ענדערען די מילך זאל די וויגערין אָנהויבען צו עסען בעסערע שפּיזען.

דויאַזאָנאָ. ווי געווענליך איז כמעט נישט דאָ איין מענטש, ער זאל זיך נישט אַרײַן נעמען אַ פיזיעל האַלץ אין דער האַנד אַרײַן. דאָס דארף מען זעהן באלד אַרויס צו נעמען, בעווייל דאָס קאָן אַמאָהל אָנמאַכען אַ שאַרף ענטצינדונג אויף דעם אָרם און אויך מאַטעריע. אויב די דויאַזאָנאָ איז אַרײַן טיעף און עס איז זי שווער אַרויס צו ציען, אויף דעם איז דאָ אַ הויזליכע רפואה. מען זאל איינשמירען אויף דעם אָרם מיט דויעגנישט, און מען זאל אַביסעל איינעמען אַ טיכעל אויך מיט דעם דויעגנישט און מען זאל מיט דעם טיכעל פֿערבאַנדענערען אויף דעם אָרם ווי די דויאַזאָנאָ וועט. און כמשך פֿון 15 ביז 20 מינוט הויבט די דויאַזאָנאָ אָן פֿון זיך זעלבסט ביסעלעך ווייט אַרויס צו ריקען זיך, אזוי אז מען קאן זי שוין אָהן נעמען ביי דעם עק און אַרויסציהען.



(ה)

האלדז. האלדז-וועהמאג איז פֿערהאן עטליכע מינים. אַגעוועהנליכע האלדז-וועהמאג איז על פי רוב פֿון אַ פֿערקילונג, וואָס איז מאַנדעל אָדער בידע מאַנדלען ווערען אַביסעל געשוואַלען. אויב מען פֿערהאפט דאָס נישט באלד קאָן עס אָנגעמען אַ שווערען האַראַקטער, עס זאל זיך מאַכען געשווירלעך אויף די מאַנדלען, וועלכע עפֿענען זיך באלד און געבען אַרויס פֿון זיך וויסען איימער. עס איז אָבער פֿארהאָנגען נאָך אַ שווערערע האַלדז-קראַנקהייט, וועלכעס עס רופֿט זיך דיפֿטערייט, און דאָס הייסט שוין אַ געפֿערליכע קראַנקהייט. און ביי דעם מוז מען זיך שוין ווענדען צו אַ דאָקטאָר, וועלכער דארף באלד מאַכען איינשפּריצונג אונטער די הייט מיט אַזאָ ווערן, וועלכער איז ספּעציעל דערצו געמאַכט געוואָרען. נאָך אַ ערגער געפֿערליכע „האלדז-קראַנקהייט“ איז פֿערהאָן, וועלכעס עס רופֿט זיך „האלדז-שווינדרוכט“. צו דעם איז קיין שום ספּעציעלע רפואה נישט דאָ, נאָר אַמאָהל קאָן העלפֿען צו דעם זעהר גוטע פֿרישע לופֿט אין אַוואַלד.

האַלדז. צו אַגעוועהנליכע האַלדז-וועהמאָג וואָס די מאַנדלען ווערען אַביסעל אָנגעשוואַלען דורך אַ פֿערקילונג. איז דאָס ערשטע דארף מען אַרום צו לעהגען דעם האַלדז מיט קאַלמץ קאַמפּרעסען פֿון זאַלץ-וואַסער, אָדער פֿון וואַסער מיט שפּרייט. אויך דארף זיך דער קראַנקער שווענקען דעם האַלדז אלע מאָהל מיט „בור-ווייערע“ אָדער מיט „קאַלעק-וואַסער“. אָדער מען זאָל קויפֿען אין אַפּטיק דאָס קרייטעכץ „מאַלוואַ“ Fol Malva דאָס צו פֿעבריהן אַזוי ווי מײַ און צו לאָזען אויס-קיהלען. מיט דעם איז זעהר גוט צו שווענקען זיך דעם האַלדז.

האַלדז. אויב עס האָט זיך געמאַכט געשווירלעך מיט איימער אויף די מאַנדלען, דארף מען לאָזען פֿענדוליווען דעם האַלדז פֿון אינוועהניג. צו דעם מוז מען שוין האַבען אַ דאָקטאָר אָדער אַ גוטען פֿערלשער, ער זאל פֿערשרייבען מיט וואָס מען זאל פֿענדוליווען דעם האַלדז. ביי דעם דארף מען אויך דעם קראַנקען איינצוגעבען אויף אַב-פֿיהרען.

האגד. עס מאכט זיך אמאָהל אז די הויט פֿון די העגד ווערען צו-
שפּאַלטען, און די הויט ווערט אזוי ווי שיפּען. הויזליכע
רפואה, אָב צו וואַשען די העגד מיט וואַרעם וואַסער און מיט זיך,
נאָכהער וואָל מען פֿון זיך אַבריינגען די העגד מיט אַביסעל וואַרעם
וואַסער. און ווען די העגד זענען נאָך נאָס, וואָל מען אויסרייבען די
העגד מיט גלייצערין. מען וואָל אזוי רייבען די העגד מיט דעם גלייצערין
3 מינוט, כדי די הויט וואָל גוט איינזאָפּען דעם גלייצערין. דערנאָך וואָל
מען די העגד גוט אַבווישען אויף טרוקען. נאָך דעם וואָל מען זיך היטען
נישט אַרויס צו גערן אויף די קעלט מיט קיין נאָסע העגד.

האר. אויב עס האָט זיך געמאַכט אויפֿן קאָפּ אַ לויט, און מען וויל
עס וואָל צוריק בעוואַקסען ווערען מיט האַר. הויזליכע רפואה,
אויסצומישען 2 לעפּעל רצין-עהל מיט אַ געלעכץ פֿון אַ פֿריש היגערין
איי. מען וואָל דאָס גוט מישען ביז עס וועט ווערען אזוי ווי אַ וואָל.
מיט דעם וואָל מען גוט איינרייבען אויף דעם לויט 2 מאל טעגליך.
האר. עס איז פֿערהאן אַ האַר-קראַנקהייט וועלכעס מען רופֿט „קאַלטון“.
די קראַנקהייט באַשטעהט פֿון דעם, די האַר פֿאַרדערען זיך
זעלבסט אלע צוזאַמען, אז עס איז אוממעגליך צו צושטערן זי, און
זי ווערען אזוי ווי איין מאַסע אויפֿן קאָפּ. איידער דאָס מאַכט זיך איז
דער גאַנצער קערפּער נישט בערוהיגט, און איז אויך זעהר שוואַך, נאָך
דעם וואָס דער קאַלטון פֿאַרדערעט זיך ווערט שוין אויפֿן קערפּער
לייכטער. צוליב דעם האָבען פֿיער מענשען אַ מעות און לאָזען אַ מאָהל
מאָכען אליין אַ קאַלטון פֿון די האַר אויפֿן קאָפּ, און זי גלייבען אז
דורך דעם וועט דער מענש קרעפּטיגער ווערען. אָבער לויט חכמת
הרפואה איז דאָס אַ נאָרישער געדאַנק, וואָס די שעפּערס מיט די
זנאָכארעס האָבען אויס געקלעהרט.

האר. קיין רפואה צו אַ קאַלטון האָבען נאָך די דאָקטוירים נישט
געפֿונען. אָב צו שעהרען אַ קאַלטון איז אפילו לויט דאָקטוירים
אויף אַ סכנה. נאָר טייל דאָקטוירים געבען אַ עצה, אויב עס איז זעהר
בויטיג דעם קאַלטון אַראָב צו געמען, וואָל מען דעם מענש מיט דעם
קאַלטון אַריינזעצן אין אַ וואַנע וואַרעם וואַסער ביז צום האַלדז. און
דאָן וואָל מען מיט אַ גרינדיג שפּוועל ביסלעכווייז אונטער ברענגען דעם

קאלטון. ביו ער פאלט אין גאנצען אראב. נאכהער זאך מען באלד אויסרייבען גוט דעם קאפ מיט שפיגנארד-עהל *oli Lavanduli* אבער צו מען קאן זיך אויף דעם באמת פערלאזען צו נישט, און נאך דערווייל א ספק. בעווייל דאס איז גאנץ גוט בעוויסט, אז ביי פילע מענטשען וואס מען האט ביי זיי אכגעשוירען דעם קאלטון, זענען זיי דערנאך גוט קראנק געווארען. אלץ זאל מען זיך אויף די עצה אויף נישט אזוי גיך פערלאזען, אויסער ווען די זאך איז זעהר שטארק גייסטיג.

האר. צו שטארקען די האר, זאנען נישט אויסקריבען, נאר זיי זאלען שעהן וואקסען. זאל מען קליינען אין אפטיק חנינן-וויין. דאס הייסט אזא וויין וואס איז געמישט מיט חנינן. און מיט דעם וויין זאל מען זיך וואשען דעם קאפ אלץ אין דערפריה.

הארץ. דאס הארץ פון מענטש איז דער מלך פון אלע אברים, און דאס גאנצע לעבען פון מענטש הענגט אין הארץ. דאס הארץ איז אבער דאס עהרעלסטע אבר פון אלע אברים, און אלע וואס קאן עס שאמען. אלץ דארף מען וויסען דאס הארץ גוט אפצוהימען. און ווען דער מענטש פיהלט נאך עפעס א קראנקהייט, אדער שוואכהייט ביי דעם הארץ, זאל ער זיך באלד ווענדען צו א גוטען דאקטאר.

הארץ. צו הארץ-וועהמאג. אפטיק-רפואה, צו קליינען אין אפטיק רוסט-טי *herba Ruta* דאס צו פאבריהן אין קאכענדיג וואסער און צו טרינקען אזוי ווי מיי עמליכע מאהל טעגליך. מען קאן אויך די רוסט-טי איינזאמעלען אין גוטען וויין. נאך דעם וואס עס ווייגט זיך 3 טאג קאן מען שוין טרינקען פון דעם וויין. דער קראנקער דארף טרינקען פון דעם וויין אמוועניגסטענס חאטש 3 וויין-גלעזליך איבערן טאג.

הארץ. צו הארץ-וועהמאג. א הויזליכע רפואה. צו נעמען א האלב קוואטירל אומגעזאלצענע בומער. און א האלב קוואטירל גוטען בינען-האניג. די בידע צוזאמען איבער צו קאכען אביסעל ביי דעם פייער און גוט אויסצומישען. בשעת עס שמעקט ביי דעם פייער איז גוט אויף ארבעט צו טוהן א גלעזעל גוטען וויין, אדער א גלעזעל קאניאק, אדער א גלעזעל אקעוויט. נאכהער נעמט מען דאס אוועק פון פייער.

מען לאזט עס אַבקהלען. און כּוֹן דעם זאָל דער קראַנקער נעמען אלע 3 שעה א קאויי לעפעלע.

הארץ. צו הארץ-קלאפונג. א הייזליכע רפואה, צו טרינקען עטליכע מאָהל אויף ביינאכט א גלאָז צוקער-וואַסער. אויף דעם דארף מען צו צולאָזען אין א גלאָז געקאכט וואַסער פֿון 8 ביז 10 לויט צוקער. און אלע אין דערפֿריה זאָל דער קראַנקער אויפֿעסען גילטערן א ציגלעלע בלויז אָהן זאָל און אָהן ברויט.

הונד. א בויס פֿון א משוגענעם הונד איז ווער געפֿערליך. דער משוגענער הונד האָט א שרעקליכען גיפֿט און די ציין, דורך וועלכען דאָס בלוט פֿון דעם מענש ווערט אויף פֿערניכטעט ביסלעכווייז. ביז דער מענש ווערט אויף משוגע און שטארבט אין שרעקליכע יסורים. דאָס משוגעט פֿון דעם מענש באַשטעהט פֿון דעם, אז עס דאכט זיך איהם אז ער זעהט נאָר בלויז הונד, סײַ אין דעם וואַסער וואָס מען גיבט איהם צו טרינקען, סײַ אין דעם עסען, און אַרום און אַרום קוקט אלץ ביי איהם אויס נאָר הונד און הונד, און פֿאַר וואַסער שרעקט ער זיך שטארק. די קראַנקהייט ביי דעם מענש קאָן זיך אַמאָהל בע-ווייזען הערשט אין א 2 יאָהר שפּעטער נאָכײַן בײַם. צו דעם הערפֿט גישט קיין שום אנדערע רפואה, נאָר וואָס אין איינערע צייטען האָבען די גרויסע דאָקטוירים אויסגעארבײַט אזא מין זערום, פֿון וועלכען מען מאַכט דעם מענש איינשפּריצונג אונטער די הויט, און פֿון דעם ווערט דער מענש זיכער געהיילט אין גאנצען. אין די גרויסע שטעט האָלט די רעגירונג אויף ספּעציעל אַוועלכע דאָקטוירים מיט שפיטעלער, די היילען אַוועלכע קראַנקע. די שפיטעלער ווערען אָנגערופֿען „פּאַסטערס אינסטיטוט“ אויף דעם נאָמען פֿון דעם גרויסען געלערענטען פֿילאָזאָף Pasteur פֿון פֿראַנקרײַך, וועלכער איז דערגאנגען די רפואה.

הונד. אויב דער געביסענער ווערט משוגע, דארף זיך יעדער מענש פֿאַר איהם שטארק צו היטען, ער זאָל נישט בעקומען קיין בײַם פֿון איהם, טאָמער גיבט דער משוגענער עמעצען א בײַם, ווערט יעדער אויף באלד אָנגעשטעקט פֿון די געפֿערליכע קראַנקהייט, און דער משוגענער ווייטער וואַלט גערען נאָר יעדען מענש צו בײַסען, אַלזאָ דארף מען זיך פֿאַר איהם שטארק צו היטען.

הונד. יעדער אידלער מענטש וואס האט פערשטאנד דארף זיין געהוימען נישט צו שפילען זיך מיט קיין הונד, נאך צו זיין שטארק דערווייטערט פון איהם, בעווייל פונקט אזוי גוט ווי אין א חויר געפונען זיך די מיקראבען וואס רופען זיך „טריכינוס“ פון וועלכען דער מענטש וואס איז נישט דערווייטערט פון קיין חויר קאן קראנק ווערען אויף Trichinosis אזוי גוט געפונט זיך ווייטער ביי הונד אסאך מיקראב וואס רופט זיך Echinococcus דער מיקראב קאן זיך גרינג איבערטרעגען צום מענטש, פון וועלכען עס קאן זיך ענטוויקלען אין בויה אגעוויקס אזוי גרויס ווי א הויפטעל קרויט. און אין פילע פאלען פערשאפט דאס דעם מוירט אויפ'ן מענטש. אלוא דארף מען זיך פון א הונד שטארק דערווייטערען.

הוסט. דער הוסט ווערט ארויסגערופען ביי דעם מענטש דורך פילע-ערליי קראנקהייטען. אמאהל איז די אורזאכע פון הוסט אלינגען-קראנקהייט, אמאהל איז דער הוסט איבער א האלדז-קראנקהייט. אלוא אז מען וויל היילען ריכטיג דעם הוסט, דארף מען בעווייזגען די קראנקהייט, וועלכע איז די אורזאכע פון דעם הוסט.

הוסט. פון די אפטיק מיטלען וואס מען קאן זיך זעלבסט בענוצען מיט זיי זענען פאלגענדע:

ברוסט-טיי Species pectorales דאס פעבריהט מען אזוי ווי געווענליכע טיי און מען שרינקט מיט צוקער. מען קאן דאס אויף שרינקען מיט מילך.

איסלאנדיק-קרייטעץ Lichen Islandici מיט דעם דארף מען זיך אויך אזוי צו באגעהן אזוי ווי מיט ברוסט-טיי.

הוסט. הויזליכע מיטלען, צו שרינקען מילך מיט בוסער. צו שרינקען ווארמע קאזע-מילך באלד נאך דער מעלק. אויך העלפט א סאךל מען ואל צושטויסען שוועבעל דין אזוי ווי מעהל, און מען ואל אויך צושטויסען קאנדעל-צוקער דין אזוי ווי מעהל. די בידע מיטלען ואל מען אויסמישען גלייך אויף גלייך, און פון דעם ואל דער קראנקער איינעמען נישטערען א האלב קאזע-לעפעלע מיט ווארעמע מילך. און פילע פאלען הערפט מען ואל זיך לאזען שטעלען אויף די פלייצעס שרוקענע ביינקעס (קעס).

הוסט. צו א טרוקענעם הוסט, וואס עס שטעכט פארענט אין די ברוסט. אפטמק רפואה צו קויפן אין אפטמק וואועלינג מיט מאנדעל-עהל *oli amigdal* פון די בירע מיטלען ואל מען נעמען 2 בליכע מיטלען און דערווארעמען ביי דעם פייער. מיט דעם ואל ויך דער קראנקער שטערען די ברוסט 2 מאהל טעגליך. אין אויף דעם ארט ווי עס שטעכט איהם, ואל ער ויך לאזען שטערען באלד טרוקענע קעפ (בזנקעס).

הייזיריג. אממנסמענס טרעכט ויך, אז מען ווערט הייזיריג פון א פערקיהדעכץ. אפטמק רפואה, צו קויפן אין אפטמק ברוסט-טעה, וועלכעס רופט זיך „ספעקציעס-פעקטאראלעס“ *Species pectorales*. דאס ואל מען פערביוהן אזוי ווי טי, און מען ואל דאס טרינקען מיט מילך און מיט קאנדעל-צוקער.

הייזיריג. הויזליכע רפואה, אויסצומישען א לעפעכע געשטויכענעם קאנדעל-צוקער מיט א געלעכץ פון א פריש היינערען איי. דאס אויסצוטרנקען מיט א האלב גלאז הייסע מילך. דאס דארף מען נעמען עטליכע טעג, 3 מאהל טעגליך.

הייזיריג. הויזליכע רפואה, אויסצושטרען גוט דעם האלדז מיט א בויסער שיטערען גרינעם זיף, און צו פערבאנדאזשירען מיט וואס דעם האלדז ארום און ארום.

הייזיריג. הויזליכע רפואה. אויפצוקאכען א טעפעל וואסער בערך פון א קווארט. מען ואל אריינגיסען אין קאכענדיגען וואסער א קליין לעפעלע פראנצוסקע-טערפאנטין. דאס טעפעל ואל מען ארום-נעמען מיט א גראב שטיק פאפיר, אזוי נאך אז עס ואל געמאכט ווערען אין דערהויף א שמוהל לעכעל, דורך וועלכען די פארי וועט ארויס. דאן ואל דער הייזיריגער אריינציהן אין האלדז אריין די פארי פון טעפעל. אזוי ואל ער טוהן עטליכע מאהל וועט דאס הייזיריגקייט אוועק געדן.

העמארידיין. דאס איז א קראנקהייט פון צווייטער צרות. ביי טייל מענשען גייט דאס געברויט ווער פיעל, דורך דעם וואס עפענען זיך די בלוט-אדערען, וועלכע געפינען זיך ביי דעם עק פון די

סטאלצאוו-קישקא. און ביי טייר מענשען מאכט זיך דאָרט אַרום און אַרום פּוקלן, וועלכע פֿערשאַפֿען דעם מענש גרויסע שמערצען. די קראַנקהייט מאַכט זיך אַנעסם נאָר ביי די מענשען, וואָס האָבען נישט אלע טאָג קיין שטיל-גאָנג, אַלואַ קאָן מען זאָגען ביי דעם אז דער מענש איז זיך זעלבסט שולדיג, מיט דעם וואָס ער האָט נישט געטוהן קיין מיטלען, אז ער זאל האָבען אלע טאָג אַ ווייניקען שטיל-גאָנג. עס פֿעהלט נישט אויף דעם קיין מיטלען אין אַפּטיק. מיט קיין שום מיטלען זענען די אַפּטיקען נישט אַזוי ריזיג און ספּעציאַל, ווי מיט די מיטלען קענען שטיל-גאָנג. ביי די מענשען וואָס די קראַנקהייט איז שוין פֿאַר-עלטערט מיט אַ שווערען האַראַקטער אין בידערליי הינזיכטען, עס געהט פֿון איהם פֿיעל בלוט, און די סטאלצאוו-קישקא איז באַזעצט מיט פּוקלען, איז די בעסטע עצה ער זאל זיך לאָזען מאַכען אַ אַפּעראַציע. **העמארידען.** קענען בלויע פּוקלען קאָן מען זיך באַגעהן אָן אַ אַפּעראַציע. דאָס היילען די פּוקלען בעשטעהט פֿון 3 זאכען (1) וויץ-בעדער, (2) זאלבען, ווײַז צו מאַכען די פּוקלען. (3) איינע צוגעמען אלע טאָג ברייט-פּולווער, אָדער אנדערע ליכטע מיטלען, איז מען זאָר האָבען אלע טאָג שטיל-גאָנג.

העמארידען. וויץ-בעדער איז גוט צו מאַכען, אַנצוקאכען 2 קוואַרט וואַסער און אַריינצוטוהן אַ פֿולע האַנד קאמפלען טי, וועלכעס רופֿט זיך אין אַפּטיק „רומיאַנעק“. דאָס וואַסער זייט מען אויבער און מען גיסט אַריין די הייסע וואַסער אין אַגרויסע שיסעל, דער קראַנקער זאל זיך אין דעם וואַסער אַריין זעצן אויף אַ האַלבע שעה. אויב עס שמערצט איהם אַזוי צו זיגען דורך דעם האַרטקייט פֿון די שיסעל, דארף מען אַריין לעהגען אַ שטיק וואַס אָדער אַ אנדערע ווייכע זאך. אויך איז גוט צו מאַכען וויץ-בעדער פֿון „פּאַקרויוועס“. דאָס איז יעדען בעוויסט די גרעזער וואָס מען ברייט זיך אָהן אז מען רירט זי מיט די בלויזע הענד. די גרעזער זאל מען אָבקאָבען, דאָס וואַסער זאל מען אויבערוועגן אין אַ שיסעל אַריין, און דער קראַנקער זאל זיך אַריין זעצן, אַלס אַזוי ווי אויבער דערמאָנט איז. נאָך די בעדער דארף זיך דער קראַנקער צולעהגען אַ זאלב אויף די פּוקלען.

העמארידען. זאלבען צו פּוקלען איז פֿערהאָן פֿיעל. נישט יעדען מענש שלאָגט אָבער אָהן איינע און די זעלבע זאלב. דאָס וועל דאָ בעשרייבען אַזעלכע מיטלען און זאלבען, וואָס מען קען

וידע וקלמט מאכען יעדער מענטש אין דער העם. אפטיק רפואה, צו קיפּען אין אפטיק באַראַוו-עססיג, עס רופט זיך „ליגנאוו-באַראַוו“ *Lign. Barovi* פון דעם עסיג וואָל מען אַרײַן טוהן אַעס לעפּעל אין אַ האַלב גלאָז וואַסער, אויך וואָל מען קיפּען האַלאָהן, און מען וואָל איהם צו שמויסען, און מען וואָל אַרײַן טוהן אין דעם האַלבן גלאָז וואַסער אַ האַלב קאָוו לעפּעלע האַלאָהן. דאָס וואָל שטעקן אויף אַוואַרעם אַרײַן. אין דעם וואָל מען איינטיקען שטויקלעך וואַס, און מען וואָל צו-לעהנען אויף די פּוקלען.

העמארידען. נאָך אַ וואַלב צו פּוקלען, וואָס מען קאָן זיך אַלײַן מאַכען, צו נעמען אַ לעפּעל שמיטטאנקע אָדער אַ לעפּעל אומגעוואלענע בוסער, און מען וואָל צושמויסען האַלאָהן מיט גרינשפּאַהן, עס וואָל זײַן דין אַזוי ווי מעהל. דאָס וואָל מען אַרײַן טוהן אין די בוסער אָדער אין דער שמיטטאנקע און גוט אויסצומישען, עס וואָל ווערען אַזוי ווי אַ וואַלב. דאָס וואָל מען אַנשמירען אויף וואַס, און צולעהנען אויף די פּוקלען.

העמארידען. נאָך אַ וואַלב צו פּוקלען, וואָס מען קאָן זיך אַלײַן מאַכען. צו נעמען אַעס-לעפּער חויר-פּעסן אומגע-וואלענע, דאָס וואָל מען צולאָזען בײַ דעם פּייער, עס וואָל נאָך ווערען שיטער און גוט וואַרעם. און מען וואָל נעמען אַ קאָוו-לעפּעלע יאָרינא, צו קיפּען אין אפטיק *Tr. jodi* די יאָרינא וואָל מען אַרײַנטוהן אין דעם חויר-פּעסן און אויסמישען, און לאָזען אַבקיחלען. דאָס וואָל מען אַנשמירען אויף וואַס, און צולעהנען אויף די פּוקלען.



(7)

וואַרצלען. אפטיק רפואה, צו קיפּען אין אפטיק „קראָזאָט“ *Kreosol* פאַר 5 קאָפּ. אין דעם וואָל מען איינטיקען אַרײַן הערצעל און מיט דעם העלצעל וואָל מען באַנעצען אַלע סאָג די וואַרצלען. ווערען זײַ אַבגעדרוסט ווערען.

וואַרצלען. הויזליכע רפואה, צו באַנעצען אַלע סאָג די וואַרצלען מיט עסיג-עססענצע.

ווארצלען. הייזליכע רפואה, צו נעמען א גאל פון וואס פאר א בהמה
עס איז, דאס גיסט מען אריין אין א גלעזעל, און מיט
דעם סאך פון די גאל וואס מען אלע סאך באנעצען די ווארצלען.

ווארצלען. אויב די ווארצלען זענען הארטע, וואל מען צו שניידען קנאכעל
און אגרייבען גוט די ווארצלען עטליכע טעג, וועלען זי
אברארען, און פערלויבען ווערען.

ווארצלען. הייזליך מיטעל, אריין צונעמען אין א גלעזעל אריין די
שוים וואס רינט ארויס ביי א פערד פון פוסק נאכ'ן גיך
לויפען, מיט דעם וואל מען שמירען די ווארצלען עטליכע מאהל. נאכ'ן
שמירען אין א 2 שעה ארום וואל מען די ווארצלען אב וואשען מיט
אביסעל ווארעם וואסער, דורך דעם מיטעל וועלען אלע ווארצלען מיט
איינמאהל פערשווינדען ווערען.

ווערם-וואנצען. דאס מין פאראומטען איז אויך נאך בעשאפען געווארען
אנצוטוהן דעם מענטש שמערצען און זאלען אויסנאגען

פון איהם דאס בלוט, צו פערטרייבען זי, וואל מען אויסשמירען די
אלע ערטער ווי זי בעהאלטען ויך מיט שטארקען קארבול-וואסער. דהיינו
מען וואס אויסמישען איין לעפעל קוואס-קארבול מיט 5 לעפעל וואסער.
דאס וואל מען גוט אויסמישען און מיט דעם שמירען.

נאך א הויז-מיטעל געגען די וואנצען, מען וואל אויסשמירען אלע
זייערע באהעלטנישען מיט עססיג עססענציע.

נאך א מיטעל, מען וואל אבקאכען א גאל פון א בהמה מיט
א קוואטירעל וואסער, און מיט דעם וואסער אויסשמירען א.ע. זייערע
ערטער.

נאך א מיטעל, מען וואל אויסשמירען די אלע זייערע ערטער מיט
דעם געזאפענעם ראסעל פון הערניג, וועלכעס עס בלייבט אונטען אין
דער טון. דאן וועלען זי יך פון די ערטער אבטראגען.

ווערם. מען קאן זאגען, אז במעט ביי יעדען מענטש געפונען ויך אין
זיינע געדערם פיעל ווערם. נאך נישט ביי אלע מענטשען איז
די צאהל פון די ווערם גלייך. ביי די מענטשען וואס זענען פאלקאם
געזונד, און אויסער דעם היטען זי ויך זי ווארען עסען גוטע ריכטע

שפיוצן, איז דאָ בײַ זײַ וועהנגער ווערם ווי בײַ די מענשען וואָס די געדערם זענען בײַ זײַ שוואַך. און נאָך דער צו אויב זײַ עסען נאָך פֿערדערבענע מאכלים, דאָן זענען זייערע געדערם א גוטע נעסט פאר פֿיעל מינים ווערם. די געדערם-ווערם הויבען זיך אָן נאָר בײַ קליין דהיינו בײַ קליינע קינדער אױף באלד זײַ זענען נישט פֿאלקאם געזונד אויף די געדערם, קאָן מען זעהן אין זייער ארויסגאנג פֿון אײַן מאַהל טויזענדער קליינעקע ווערעמלעך דינע און עטוואָס לענגעכדיג. עס געפֿונען זיך אַבער אפֿילו בײַ יונגע קינדער גרויסע לאנגע קיילעכדיגע ווערם, בערך 10 צאָהל די לענג. אזעלכע ווערם אויב זײַ זענען דאָ צו פֿיעל, קאָנען זײַ שוין ארויס רופֿען א שווערע קראנקהייט בײַ דעם מענש, זײַ בייַסען אַמאָהל די געדערם זעלבסט, איבער וועלכען דער מענש הייבט אָהן פֿרוצלינג צו ספּאזמירען און בעקומט די קרעמפֿען. דאָס זעלבע מאכט זיך אַממיינסטענס אין מיטען שלאָף. און אויסער דעם, נעמען זײַ אוועק פֿון דעם קערפֿער פֿיעל פֿייכטיגקייטען און פֿעטעקייטען, וועלכע זענען זעהר נויטיג פֿאַר'ן קערפֿער. און דורך דעם דארט דער מענש אָדער דאָס קינד, און זעהט אויס בלאַס אויפֿ'ן פנים.

ווערם. דאָס איז אלץ אַז מען לאָזט זײַ הפֿקר, זאָלען לעבען פֿריי, דאָן זענען זיך די שקצים ורמשים גוט פֿרה ורבה אין די געדערם, און זײַ טאנצען דאָרט ארום אױף ווי סאָדאטען אין זייער קאזארמע. אַבער די מוטער וואָס איז געטריי איהר קינד, און זי האָט נאָך אַביסעל פֿערשטאנד אין קאפֿ אויך, זי דארף גוט אַכטונג צו טוהן אויף דעם, און זאָל מלחמה האַלטען מיט די שעדליכע אומגעבעטענע געסט, דאָן וועט זי קאָנען געוויס פֿערטרייבען די פֿאַראַזיטען פֿון איהר קינדס געדערם. דאָס בעסטע מיטעל קענען די ווערם איז דאָס קרייטעכץ וואָס רופֿט זיך אין אפּטיק ווערם-קרויט. נאָר נאָר קליינע קינדער, וועלכע עס איז שווער איינצוגעבען ווערם-קרויט, בעקומט מען צו קייפֿען אין אלע אפּטיקען אזעלכע פּאַסטילקעס צו די ווערם. אַמבעסטען איז איינצוגעבען אַבזוטרייבען די ווערם אין סוף חודש, בעווייל דאָן זענען די ווערם שוואַכער. אין 2 שעה אַרום נאָכ'ן איינגעבען דאָרף מען געבען דעם קינד אַ מיטעל אַבזאָפּהרען. אױף נאָך וועלען די ווערם זיכער ארויסגעיאָגט ווערען פֿון זייערע נעסטען.

ווערם. אויסער די קיילעכדיגע לענגעכדיגע ווערם, זענען פֿערדאנען נאָך אנדערע מינים ווערם, וועלכע ווערען נישט געבוירען אין

מענשליכען קערפער נאָר זיי האפּען זיך אַרײַן און מענשליכען קערפער פֿון אנדערע באשעפֿענישען, אזוי ווי „טרויניגן“ פֿון חורום, „עחנאָקאָקוס“ פֿון כלבים, אירען זענען אָבער אָבערשט פֿון די צוויי באשעפֿענישען, טרעפט זיך זעהר וועהניג ביי אירען דאָס מין ווערם. עס איז אָבער פֿערהאן נאָך אַמין וואָרם, דער אומגעבעטענער גאסט געפֿונט זיך ביי אירען אויף, בעווייל די איינערלעך פֿון דעם וואָרם געפֿונען זיך אַמאָהל אין ריגדס פֿלייש אויך.

דער וואָרם איז פֿלאַטיג און לאַנג, אזוי ווי אַ סטענגע. ער קאן אַמאָהל האַלטען ביז 300 עהלען לאַנג. דער „סאָליטער“ באשטעהט פֿון אַ קליין קעפּעלע, וועלכעס איז בעוואַקסען אַרום און אַרום מיט 26 קליינע הערנערלעך, אזוי ווי ביי דעם קעפּעל פֿון אַ ביהן. און פֿון דעם קעפּעל וואַקסט און וואַקסט אָהן אַוויפֿהער קליינע פֿלאַטיגע שטיקלעך, איינס איז באַהעפט אין דעם זינדערען, אזוי ווי אַ לאַנגע קייט פֿון שיפּען. אז די שטיקלעך זענען שוין אָנגעוואַקסען גענוג לאַנג, רייסט זיך אָב אלע מאָהל אַ לאַנג שטיק, וועלכעס געהט אַרום פֿון קערפער מיט דער אַרױסגאנג פֿון דעם מענש. פֿון די שטיקער, וועלכע רייסען זיך אָן און געהן אַרום ווערט דער „סאָליטער“ גאָר נישט אָנגע-שוואַכט, און דאָס אַרט אייהם גאָר נישט וואָרען דער עיקר „סאָליטער“ איז נאָר דער קאָפּ. אָבער פֿאַר דעם מענש איז דאָס גרויסקייט פֿון דעם מוזיק אַ אומגליק, בעווייל וואָס גרעסער און לענגער דער מוזיק איז, ציהט ער אין זיך אַרײַן מעהר פֿייכטיגקייט, וועלכעס איז זעהר נויטיג פֿאַר'ן קערפער. אָב צוטרײַבען דעם „סאָליטער“ איז נישט אזוי קיין גרינגע זאך. בעווייל ער האַלט זיך גוט אָהן מיט זיינע 26 הערנערלעך אין די געדערם. אַלזאָ טרעפט זיך פֿילעל מאָהל אז מען טרייבט אָהן אפֿילו בערך 100 עהלען פֿון „סאָליטער“, אָבער דאָס קעפּער בלייבט, דאן איז די גאנצע אַרבייט גאָר בחנם, אַלזאָ דער קראַנקער, וועלכער ליידעט אויף דער קראַנקהייט מוז זיך ווענדען צו אַ ספּעציעלען געניטען דאָקטאָר, וועלכער קאן אָבטרייבען אין גאנצען דעם מוזיק פֿון מענשליכען קערפער. עס איז אין די לעצטע צײַטען צו געקומען אין די אפּטייקען גאנץ ויכערע און ספּעציעלע מיטלען, אָב צו טרייבען אין גאנצען דעם „סאָליטער“.

ווערם. פֿון הויזליכע מיטלען גען ווערם ביי קליינע קינדער, זענען די בעסטע מיטלען פֿאַלגענדע : 1) צו קאָכען מילך מיט קנאָבעל און געבען דאָס די קינדער צו טרינקען.

(2) אויסצומישען געשטויסענעם צוקער דין אזוי ווי מעהל מיט גוטען
בויםעהל. פון דעם זאל מען איינגעבען די קונדער צו 2 קלדינג
לעפעלעך. אין 2 שעה ארום זאל מען זי געבען אב צו פיהרען
רצין-עהל.

(3) אַנצושמירען צעפויער אונטערן נעזעל מיט דויעניטש. צו ווארטען
5 מינוט און אַנצושמירען ביי דעם הארץ-גריבעל מיט דויעניטש. ווייטער
צו ווארטען 5 מינוט און אַנצושמירען ביי דעם נאָפּעל אויך מיט דויעניטש.
ווערם. צו פערטרייבען די קלייגענקע מילכען וואָס האָבען זיך אָנגע-
היבען צו פארטעהרען אין אַ ביבליאטעקע, דארף מען
בעשפרייזען פֿון אינוועהניג אין די ביכער-שרענק און אויף די ביכער,
אזוי ווי זיי שמעקן אין די שענק, מיט טערפאָגטין. אויסער דעם
זאל מען אריינשמעלען אין יעדער ביכער-שראנק אַ קליין טעצעלעך מיט
טערפאָגטין, אזוי נאָך וועט דער ריח פֿון טערפאָגטין זיך גוט אָנגעמען
אין די שרענק מיט די ביכער, פֿון וועלכען דאָס גווערם וועט מווען
פֿון דאָרט אַבטרעטען.



(7)

זאמער-שפרענגעלעך. הייליכע רפואה צו פערניכטען די זאמער-
שפרענגעלעך פֿון פנים. מען זאל נעמען
אַ ציטריין און צושניידען זי אויף צוויי העלפטען. דאָס ווייכע פֿון
אינוועהניג זאל מען ארויס נעמען מיט אַ מעסערל אָדער מיט אַ בלעכען
לעפעלעך. נאכהער זאל מען די שאַהלען איבער דרייהען, דאָס זאל מען
טוהן אויף דער נאכט, און מען זאל די צוויי העלפטען שאַהלען אוועק
לעהגען אויף אַ קאלט אָרט ביז אין דער פֿריה. דאָן זאל מען די
צוויי העלפטען שאַהלען דערפֿייען מיט געלעכץ פֿון פֿרישע היגערגע
אייזער און מען זאל דאָס אזוי אוועקשמעלען אויף אַ קאלט אָרט ביז
צומאָרגענס אין דערפֿריה. מיט דעם זאל מען זיך שמירען דאָס פנים,
ווערען די זומער-שפרענגעלעך פֿערלירען.

וומער וואהנונג. אזוי ווי מיר האבען בעשריבען אין דעם בוך וואס פאר א ווירקונג די ליפט האט און דעם מענטש'ס לעבען. קאן יעדער מענטש ליכט פערשטעהן, ווי וואס נויטיג עס איז פאר די שוואכע מענטשן, וואס וואהנען אין די גרויסע שטערט, אז זי זאלען זיכער זיך איבערטראגען מיט זייערע וואהנונגען אויף דער פרישער לופט.

אין די גרויסע שטערט איז דא גאנץ גענוג אורזאכען, דורך וועלכע עס ווערט פערדארבעט די לופט. דער רייד פון די קוימעג'ס, ווי עס איז דא פיעל פאבריקען פערדארבט ווער די לופט.

אין די שטערט ווי עס איז גאנץ נישט איינגעפיהרט קאנאליואציע, ווערט די לופט ווער שטארק פערדארבעט דורך דעם שלעכטען גערוך פון די בתי כסאות, און דעם גלייכען דורך דעם אומריינקייט פון די ריגשטאקען אין די גאסען. די לופט ווערט אָנגעזאפט מיט די אלע אומריינקייטען, און אז דער מענטש ציהט די לופט אריין אין די לונגען, איז נישט דוקא גאר, וואס א שוואכער און א קראנקער איז שווער געוונד צו ווערען, גאר אפילו דער געוונדער קאן פון דעם גאר גרינג קראנק ווערען.

אויסער דעם אלעם ווערט אין דער גרויסער שטארט די לופט פער-דארבעט דורך די מענטשען זעלבסט. ווארען די לופט וואס ווערט גאר אריינגעאָהעמט אין די לונגען פון מענטש, געהט זי שוין צוריק ארויס שטארק פערדארבעט, און עס איז שוין נישט געוונד פאר דעם מענטש אז ער זאל זי צוריק אריין אָהעמען אין זינע לונגען אריין.

דער וואס האלט זיך ביי איבערציהן אויף א וומער-וואהנונג זאל זיין געווארענט אין די פאלגענדע פונקטען: אויסצוויכען א דאטשע ווי עס וואקסט פיעל בוימער מיט אנדערע געוויקסען, אויב ער קאן דינגען א וומער-וואהנונג נעבען א סאטאנווע וואלד, איז גאנץ בעסער.

די וואהנונג זאך נישט זיין אויף אזוי ארט ווי עס קומט צו א רייד אדער א שלעכטער גערוך, אדער א שטויב. די וואהנונג זאל נישט זיין ענג אדער גורדיג, די פענסטער אין די וואהנונג זאל מען זעהן, זי זאלען זיין וואס מער אויפגעפֿענט נישט פערמאכט. דערביי דארף מען צו זיין אָבער געווארענט עס זאל נישט זיין אין שטוב קיין צוגווינג, ווארען דאס איז שערליך פאר'ן מענטש. און דעם שלאף-צימער ווי מען שלאפט ביינאכט זאל זיין אויפגעפֿענט א ליפטשיק. גאנץ פריה און נאכ'ן ווין-זעצען זאל מען געהן שפאצירען.

וויגערין. די פרוי וואס ווינט א קינד, אויב זי וויל האַבען נישט
געוואלטע מילך. וואָר זי עסען פֿעמע און ניסע מאכלים,
אויף וואָר זי עסען מירען, פאסטערנאָק און געקאכטע פֿרוכטען. אויס-
מידען וואָר זי וויערע, געזאלצענע און הארבע מאכלים. קארמאפֿעל
וואָר זי גאר וועהניג עסען. די וויגערין וואָס לעבען אממיינסטענס
פון קארמאפֿער, ווערען די קינדער שלאף אויף שקראפֿעל און בעקומען
די ענגלישע-קרענק.

וויגערין. די פרוי וואָס ענטוויינט איהר קינד און די בריסטען זענען
פול מיט מילך, דארף זיך פֿעהיטען די בריסטען פון
פֿעהרארטונג. זי וואָר שמירען די בריסטען מיט רצינ-עהל און פֿער-
באנדעושרען מיט וואַס, אז די בריסטען וואָרען נישט אראָבהענגען.
אדער מען וואָר צושטויסען רייז, און אויסמישען מיט וואַסער, אדער קראכמאַל
מיט וואַסער. אין דעם וואַסער וואָר מען איינטינקען טיכלעך און ארויף לעהגען
אזעלכע קאלטע קאמפרעסען אויף די בריסטען פֿיעל מאָהל.

זונגען-שלאג. עס פֿערלויפט זיך פֿיעל מאָהל ביי די מענטשען וואָס
ארבעטען נומער צייט אין דרויסען אויף די גרויסע
היטצען ווי די זונג שיינט, אז זי ווערען פלוצלינג שלאף אויף אנדריסען
קאפֿ-וועהטאָג, און דאָס פנים ווערט שטארק רויט. דאָס איז א סומן אז
דער מענטש איז קראנק געוואָרען אויף א זונגען-שלאג. די רפואה צו
דער קראנקהייט איז גאר "קעלט". מען וואָר איהם לעהגען אויפֿן קאפֿ
א פֿעכערש מיט אייז, מען וואָר איינטינקען לייליכער אין קאלט וואַסער
און מען וואָר איהם ארום היילען אויפֿן בלווען ליב מיט די לייליכער,
וועלכע דארפֿען איבערגעטוישט ווערען אלע 5 מינוט. צו טרינקען וואָר
מען געבען דעם קראנקען גאר קאלטע געטראנקען, לימאָנאד, וואַסער
מיט עסיג. קיין טעה, קיין קאפֿע, קיין שום געטראנק וואָס ענטהאלט
אין זיך אלפֿאהאל טאר מען איהם נישט געבען צו טרינקען.

(ד)

חולירע. די אויטמישע חולירע איז זעהר גיפעהרליך. דער שווארצער גאסט ווערט אלע מאהל פערשלעפט פון אויפ קיין אויפאפ, און מאכט אן גרויסע עפידעמיעס, וועלכע נעמען צו טויזענדער קרבנות.

דאקטוירים שרייבען, אז פון דער עפידעמיע איז ניד גרינגער אב צו היטען, ווי פון די פיעל אנדערע אנשטעקענדע קראנקהייטען, בעווייל דער גיפט מיט די באקצילען פון די חולירע האלטען זיך נישט אויף גוט אין דער לופט, ווי דער גיפט פון אנדערע געפעהרליכע קראנק-הייטען. אלוא איז די ראסט ארויפגעלעגט געווארן שטארק אויף דעם מענטש, אז בשעת ווען די עפידעמיע שטארקט זיך, זאל דער מענטש שטארק זיין געווארענט מקיים צו זיין דעם בעקאנטען פסוק ושמרתם מאד את נפשותיכם.

חולירע. לויט דאקטער' דארף יעדער מענטש זיין געווארענט בשעת די עפידעמיע, מען זאל זיך אבהיטען פון א פערקיהלונג, מען זאל זיך בעמיהען צו זיין נאך דארט ווי עס איז דא גוטע און פרישע לופט, און מען זאל נישט ארום דרייען זיך אויף קיין פייכטע ערטער נעבען בראטעם אדער נעבען ריגשמאקען.

אין פאלס אז די לופט איז קיהל דארף מען האלטען די פנים מיט דעם בויך אין דער ווארעם. איבער הויפט דעם בויך זאל מען ארום-גארטלען מיט א ברייטע גארטעל פון ווייכע דיקע פלאנעלי. מען זאל זיין געווארענט נישט צו טרונקען פיעל פון אזעלכע געטראנקען, פון וועלכע מען קען זיך אגשיכורען, מען זאל זיך זעהן ווי ווייט מעגליך אב צו היטען פון שווערע ארבעט, ס'פויגשע ארבעט, און ס'נע-דאנקען-ארבעט.

מען זאל עסען באלד אין דער פריה, און מען זאל זיך נישט דעוואנען ארויס צו געהן אויפ'ן גאס נישטערען. דאס עסען זאל זיין אנגעזען סאג נישט אויף אגזולעגען זיך אפארען בויך. נאך צו עסען איז גארהיט ווי מען זאל שוין באלד זיין וואט, אזוי האט עס בעשריבען אגרויסער דאקטאר, און דא זענען איבערגעזעצט זינע רייד פונקטליך ווארט ביי ווארט.

חולירע. יעצט וועלען מיר ברענגען וואָרט בײַ וואָרט, דאָס וואָס
א צווייטער דאָקטאָר שרייבט ווענען די חולירע.

לויט דאָקטערײַ דארף יעדער מענש זיין שטרענג געוואָרענט בשעת
די עפּידעמיע. קודם פֿל, אויף ריינקייט. ד. ה. אז די וואָהנונג וואָל
זיין העכסט ריין פֿון אלערליי מיאוסע זאכען. און פון אַ שלעכטען ריח.
די בתי כסאות דארף מען ניד בעמיזען אָפּטער צו רייניגען. מען וואָל
זי בעשיטען אָדער בעניסען מיט קאלד, און מען וואָל דאָרט אַלע מאָל
אויסשפּריצען מיט שטארקען קארבולאָווי-וואַסער.

אַלע און דער פּרייה דארף מען אויס רייכערען די וואָהנונגען מיט
איינס פֿון די פֿאלגענדע קרייטעכצער, וואָס גיבען אַרויס פֿון זיך
אנומען ריח: יאָלאָוויץ, מיענטא, עאוקאליפטא, סאלוויא, רוטא.

אויב מען בעקומט נישט די קרייטעכצער, וואָל מען אַלע אין דער
פּרייה גלייזען אין פֿייער אַ ציגעל אָדער אַ ברויט שטיק אייזען, און ווען
עס וועט שוין זיין גוט אָנגעגלייזט, וואָל מען אויף דעם אַרויפּשפּריצען
וויין-עססיג, און אַלע מענשען וואָלען אין זיך גוט אַרײַנאַטהעמען די
פאָרע, אויף אַזוי גוט צו שמעקען אַלע מאָל צו שוועבעל-עמעהער,
וועלכעס מען קריגט צו קויפֿען אין אַפּטיק Aether Sulfurici. און
אָנאַצען טאָג וואָל מען אַלע מאָל אויסשפּריצען די וואָהנונג מיט
קארבולאָווי-וואַסער.

מען וואָל שטרענג זיין אָפּגעהיטען פֿון טרונקען רויז קארטע וואַסער,
נאָר דאָס וואַסער צום טרונקען וואָל זיין דורכאויס איבער געקאָכט.
און נאָך גלייכער אַזוי, ווען עס דורשט וואָל מען טרונקען אַגלאָו מי,
אָדער מיענטא-מי. צו רייכערען טיטן טאבאק אין דער עפּידעמיע-צייט
אזוי נאָך געוונד. און עסען וואָל יעדער מענש באָלד אין דער פּרייה,
נאָך דעם ווי ער וועט זיך גוט אויסוואַשען דאָס מויל מיט די הענד,
דעסמיליכען אַ גאַנצען טאָג פֿאַר יעדען עסען דארף מען זיך גוט אויס-
וואַשען דאָס מויל מיט די הענד.

פֿיין רויז פּרוכטען און רויז אונערקעס טאָר מען נישט עסען.
נאָר פֿון די גוטע רויז פֿרוכטען, וואָס זענען שוין גאָר גוט צייטיג,
אזוי ווער עס וויל יאָ עפעס פֿערזוכען פֿון זי, וואָל ער האָטש זיין
געוואָרענט אָב צו שוילען גוט די שאַלען פֿון זי.

חולירע. יעצט וועלען מיר אויף ברענגען וואָרט בײַ וואָרט, דאָס וואָס
א דריטער דאָקטאָר שרייבט ווענען חולירע.

יעדער מענטש זאל זיין גוט געווארענט, אז אזוי ווי ער הויבט
נאך אן עפעס צו שפירען, אז עס פֿיהרט איהם אן, נישט אזוי ווי זיין
שטיינער איז שטענדיג, און עס הויבט איהם אן צו דורשטען אהן
א שום אורזאכע דערצו, זאל ער זיך באַלד ווענדען צו א דאָקטאָר.
אויב מען בעקומט נישט אזוי גיך א דאָקטאָר דארף מען דערווייז
אלזאן אַנגעמען מיטלען גענען דער אַבפֿוהרונג. דעם קראנקען דארף מען
צו לעגען הינטע קאמפרעסען אויפֿ'ן בויך. מען זאל נעמען א בויגען
ביבעלע פאפיר, בעניסען מיט שפּריט, בעשימען מיט געשטויסענעם
פֿעפֿער, אין דער מיט פֿון פאפיר זאל מען מאכען א לעכער, און מען
זאל דאָס ארויפֿלעגען אויפֿען בויך אזוי, אז דער גאָפֿעל זאל קומען
געגענאויבער דעם לעכער, נאכהער זאל מען אויף דעם אחוילעגען
א וואַרמע זאך אזויכע, און פֿערבאנדזשאַרען דעם בויך.
אויב דעם קראנקען דורשט שטארק, זאל מען איהם געבען צו
טרונקען מינענטא-מיט מיט רויט-וויין, וועלכער רופֿט זיך, פֿאָנטאַנ". מען
זאל קאכען געשטויסענעם רייז, אַבזייהען דאָס וואַסער און געבען דעם
קראנקען צו טרונקען. מען מעג איהם אויך געבען צו טרונקען שוואַרצע
קאווע מיט קאניאק.

מען זאל קיפֿען אין אפטיק ינאָעמזאָווע-קראַפֿלעס Kropale
nozmeowe אין מען זאל איינגעבען דעם קראנקען אלע שעה
20 קראַפֿלעס. אָדער מען זאל קיפֿען אין אפטיק וואַלעריאַן-קראַפֿלעס
Tr. Valerianae מיט מינענטא-קראַפֿלעס. Tr. Menthae. אין דאָס
אויסמישען צוזאמען גלייך אויף גלייך, און מען זאל פֿאן דעם
איינגעבען דעם קראנקען אלע שעה 20 קראַפֿלעס. אויך זאל מען
דעם קראנקען געבען צו שליינגען אלע מאָהל קליינע שטיקלעך איין,
און מען זאל איהם אַבזאשען אלע מאָל זיין פֿנים אונטער די נאָז מיט
שוועבעל עטהער Aether Sulfurici. און דאָרט ווי עס חאפט איהם אַהן
דער קורטש, זאל מען אויף די ערמער רייבען מיט א טרוקען שטיק
געוואנט, און צולעב דעם דארפֿען די מענטשען וואָס טהון ביי די קראנקע,
צו האָבען ספּעציעלע געוואנטענע הענטשקעס.

אויך איז גוט אויף די ערמער גוט איינצורייבען מיט גאָרטשינאָווי-
שפּריט, נעמישט מיט קאמפֿאָר-שפּריט, אזוי נאך זאל מען די ברייט
שפּריטען צוזאמען מישען. אז פֿון דעם גאָרטשינאָווי-שפּריט זאל זיין
3 חלקים און פֿון דעם קאמפֿאָר-שפּריט זאל זיין 2 חלקים.

דער עיקר זאך מען וויל בעמיטלעך דעם קראנקען צו דערוואַרעמען.
נישט צו לאָזן אין איהם פֿערגליווערט צו ווערען דאָס בלוט אין די
אָרערען, פֿון וועלכען דער קראנקער שטארבט. אַלואַ דאָרף מען איהם
ארום לעגען מיט הייסע פֿלעשער וואַסער. און אויב מען קען דעם
קראנקען אַרײַן וועצען אין אַהײסע וואַנע און נאָך בעסער.

די מענשען וואָס טהון ביי דעם קראנקען דאָרפֿען ווילן זעלבסט גוט
אָנהײמען, אז זיי זאָלען ווילן נישט אָנשטעקען מיט דער קראנקהײט,
דאָרום זאָלען זיי ווילן אַלע מאָהל אָבוואַשען די הענט מיט דעם פֿנים,
מיט קארבול-וואַסער אָדער מיט „עטהער“. און דאָס מויל זאָלען זיי ווילן
אַלע מאָל אויסוואַשען מיט שטארקען בראַנפֿען.

אויפֿעהויפט זאָלען זיי ווילן שטרענג און זעהר געוואַרענט נישט
אָנצורירען מיט די בלויע הענט, נישט אין דעם אַרײַסגאנג פֿון קראנקען
און נישט אין דעם אויסברעכעכץ פֿון דעם קראנקען. מיט דעם בעדאָרף
מען ווילן זעהר שטארק פֿאַרזיכטיג, בעווייז אין דעם געפֿונט ווילן דער
גיפט מיט די באַקצילען פֿון דער געפֿעהרליכער קראנקהײט. אַלואַ זאָל
מען דאָס באלד פֿערשיטען מיט קאלד, אָדער בעגיסען מיט שטארקען
קארבול-וואַסער.

חולירע. אַוואַנדערליכע זאך רעקאָמענדירען גרויסע דאָקטוירים צו
פֿערהײסען ווילן פֿון די חולירע, מען זאָל טראָגען אָנגעהאנגען
אויפֿ'ן בלויען לייב אונטערען האַרץ-גריבעל אַפֿלאַסטונקע פֿון קיפֿער-
בלעך. עס פֿערשטעהט ווילן, מען זאָל לאָזן מאַכען אַשטיק קיפֿער-
בלעך, אזוי גרויס ווי אַ האַנד פֿון אַ מענש, מען זאָל אויסמאַלען אין
דעם אַלעכער און אַדורך ציהען אַבענדעל. דאָס זאָל מען ווילן אָנהענג-
גען אויפֿ'ן האַלדז, אזוי אז די פֿלאַסטונקע זאָל קומען אויפֿ'ן בלויען
לייב אונטערען האַרץ-גריבעל קענענאייבער דעם מאָגען.

דער ערשטער אויפֿמעהער פֿון דעם איז געווען דער גרויסער
פֿילאָזאָף דאָקטאָר Haneman פֿון פֿאַריז. דער ערפֿינדער פֿון „האַמע-
אָפּאָמאָ“. דערנאָך איז געפֿאַלען אויף דער המצאה אויך דער גרויסער
דאָקטאָר Bure פֿון פֿאַריז, וועלכער האָט ווילן שטענדיג פֿערנומען
ספּעציעל מיט מעטאל-טעראַפּיאַ. אין ער האָט אין יאָהר 1850 בעשריבען
אין אַ פֿאַרזאָר צייטונג, אז קיפֿער בלעך איז זעהר אַ גוט פֿערהיטונגס-
מיטעל קעגען די חולירע-עפֿידעמיע.

דער דאָקטאָר „בורק“ שרייבט אין דער צייטונג, אז דערנאָנגען

אין ער דאס נישט אלס מערציע, אזוי ווי דער דאקטער, האנעמאן נאך אלס פראקטיק נאך אומגערעכט. נאך אין יאהר 1832, ווען אין פראנקרייך האט געהערשט שטארק די חולירע-עפידעמיע, האט ער זיך צו שמועסט מיט ארבייטער פון אנדריסע קיפער-פאבריק, ווי עס האבען געארבעט בערך 200 ארבייטער, אין ער פון זיי געוואהר געווארען, אז קינער פון זייער פאבריק אין נאך נישט קראנק געווארען אויף די חולירע, האטש דעמאלס האט זיך געפונען אין אלע הייזער ארום דעה פאבריק פילע חולירע-קראנקע.

אזוי ווי דער דאקטאר האט דאס דערהערט האט ער גענומען די נאך אין אכט, און האט אנגעהויבען צו בעוועגן אלע קיפער-פאבריקען פון פאריזער געגענד בערך 400, און האט זיך נישט איבערגעצייגט אז די חולירע-עפידעמיע האט קיין שריטה נישט איבער די אלע ארבייטער פון די קיפער-פאבריקען. דער דאקטער האט זיך נאך מיט דעם נישט בעניגען געלאזט, נאך ער האט זיך באלד גיווענדעט צו 4 פאסארען פון די 4 פארגענדע קעניגרייכען: רוסישע, שוועדישע, ענגלישע, איטאליענישע, זי ווארען די נאך איבערגעבען זייערע רעגירונגען, צום באפעלען מען וואל דאס אויך מאכען די זעלבע אויספארשונגען. און פון אומעטום איז אלץ אנגעקומען די זעלבע ידיעות, אז די ארבייטער פון די קיפער-וואווארען און פאבריקען ווערען נישט קראנק אויף די חולירע.

דאן האט דער דאקטאר „בורק“ אויסגעגעבען א בראשיווע אויף פראנצויזיש מיט דעם נאמען: Du Cuivre contre cholera an ponit de vue prophylatique et curatif אויספארשונגען וואס ער האט געמאכט אין אלע פאקטען ווי ווייט פראקטיש דאס איז, צו קיפער-מעטאל פערמאגט אין זיך א קראפט צו פערמיטען דעם מענטש פון דער חולירע-עפידעמיע. און ווען די עפידעמיע האט שטארק געהערשט אין פראנקרייך אין די יאהרען 1849 און 1850 האט מען זיך דאס פילע בענוצט מיט דער המצאה פון דאקטאר „בורק“, אין דאן איז געווען צו באמערקען זעהר גוטע רעזולטאטען, דורך וועלכע דער דאקטאר „בורק“ האט בעקומען פון די פאריזער היגיגענא-געזעלשאפט א וואלבערנעם מעדאל.

דער דאקטער „סאלאוועוו“ פון פעטערבורג גיבט צו זיין מיינונג, אז דער קיפער יספאריוועט זיך עטוואס, הענגענדיג אין דער ווארעם אויפן בלויען לייב, און דער קערפער נאכט אין עטוואס פון דעם

קטער, וועלכעס קומט אריין אין די בלוט פון מענטש. אזוי נאך
בעקומט די בלוט דעם קראפט צו פערניכטען דעם גיפט מיט די
באקטעריען פון דער חולירע, וועלכע האפען ויך אריין אין מענטשליכען
ארגאניזם.

חלשות. אהנמאכט. פיעל מאהל טרעפט ויך אז עס ווערט אייגעס
נישט גוט און ער פאלט אריין אין א חלשות, דאס הייסט אז
ער בלייבט ליגען אין אהנמאכט אזוי ווי מוירט, אין דער לעצטער רגע, ו
אירער ער פאלט אין אהנמאכט שפירט ער פלוצלונג אז עס ווערט איהם
קאלט אין קאפ, פינסטער פאר די אויגען, און עס הויבט איהם אהן
צו שומיען אין די אויערען. די סימפטאמען בעווייזען אז ביי דעם מענטש
דאס ויך פלוצלונג אראפגעלאזט די בלוט פון די געהירען. די אורזאכע
פון דעם קאן זיין אמאהל א שוואכקייט פון גאנצען קערפער, פון וועלכען
ער איז געווארען בלוט-ארמוט, אדער אנדערע צער, אדער א שרעק וואס
ער האט ויך פרוצלונג דערשראקען.

עס פערשטעהט ויך ועלבסט, אז ביי אזא צופאל איז קיין שבר מיט
צו ויזען מיט פערלעהנטע הענט גלאט אנטווקען דעם געפאלענעם און
צו ווארטען ביז דער דאקטאר וועט קומען, נאר מען מוז ועלבסט זעהן
עפעס צו טוהן צו דערהאלטען דעם מענטש ביי דעם לעבען.

אבצוראטיווען דעם מענטש איז ביי דעם המון איינגעפיהרט, אז מען
קנייטשט דעם מענטש אונטער די אויערען, מען האקט אין איהם אריין
מיט וואס איינער קאן, מען רייסט פון איהם שטיקער פלייש. און פיעל
מאהל מאכט ויך אז דער געפאלענער האט צו פיהלען די קנייטשען
א לאנגע צייט דערנאך, אבער לויט דאקטאריע איז דאס זעהר
א גרויס דומהיט.

חלשות. די דאקטאריע זאגט, אזא פרי אבצוראטיווען איז מענטש,
דארף מען ראשית דעם מענטש אנדער לעהגען אויף די
פלייצעס גלייך אויסגעצויגען. נאך בעסער איז, אז ביי דעם קאפ וואל
זיין נידריגער ווי ביי די פיס, נאכהער וואל מען איהם אויפלאזען אלע
פערבונדענען מיט אלע גארטלען, און מען וואל אויף איהם שפריצען
קאלט וואסער. די שרעקען וואל מען אביסעל רייבען מיט גוטען עססיג,
אדער מיט שפריט, אדער מיט אדע-קאלאן. די פאדעשוים פון די פיס

זאל מען רייכען מיט א הארמע בערשט, אזוי נאך וועט ער פאלד
ארטן צו זיך קומען.

אזוי ווי ער עפענט נאך די אויגען זאל מען איהם געבען אין
מיט ארען עפעס דאס הארץ צו דערקוויקען. דהיינו א ביסעל נומען
וויין, אדער נומען פרוכטען-זאפט, טיי, קאפע, א. ז. וו.



(ג)

מאבאק-רויכערען. וועגען דעם צו דאס מאבאק-רויכערען איז נומ
פאר דעם מענטש צו נישט, איז דא אין דעם
נאך פון לאנגסטיגע צייטען פערשידענע כונונגען. און ביז היינט האט
נאך נישט די פראגע קיין בעשטימטען ענטפער. בעווייל די דאקטוירים
וואס האבען ליב צו רויכערען זענען מליצים טובים פאר דעם רויכערען
און בעשרייבען נאך די מעלות. דאנעגען ווייטער די דאקטוירים וואס
האבען גלאט נישט ליב צו רויכערען בעשרייבען ווייטער נאך די פעהלערס
פון רויכערען.

און בעפאר איך וועל דא בעשרייבען בידערליי מונונגען מוז איך
בעוואוסט מאכען, מען זאל קודם וויסען וואס פאר אנאייגענשאפט דער
מאבאק האט אין זיך, דאן וועט מען שוין קאנען פערשטעהן וועגען וואס
דא האנדעלט זיך.

אין דעם מאבאק געפינט אזא מין אלקאלאיד, דאס הייסט דאס
פייכטיגקייט פון די בלעטער, וועלכעס רופט זיך מיט דעם נאמען „ניקאטין“.
און דאס איז זעהר א שטארקער סם, סיי פאר מענטשען, סיי פאר אנדערע
לעבעדיגע באשעפענישען. איינער פאר די שווארצע און בראנע האלב
וויילדע מענטשען, אזוי ווי די גענערס פון אפריקא, אמעריקא און אויסט-
האליע, דעסמאליכען די שווארצע ציגיינערס, אויף זיי אלע ווירקט נאך
גישט שלעכט דער גיפט „ניקאטין“. נאך אדרבא, זיי לעקען אויס דעם

סאָק פֿון די טרובקע, אזוי ווי מיר לעקען אויס דעם סאָק פֿון איינגעמאָסן.
אין די געוועהנליכע רויכער-מאכאקען, וועלכע עקוועסטירען אין
איראפּא נעפֿינט זיך „ניקאטין“ לויט דעם רעכענונג: אין דעם ערשטען
כאַרט מאכאק געפֿינט זיך „ניקאטין“ בערך 0,25%, דאָס איז נאָר אין
דעם שטארקען מאכאק, אָבער דער שוואַכער מאכאק פֿון ערשטען סאָרט
ענטהאַלט נאָר אין זיך „ניקאטין“ בערך 0,17%, דער מאכאק פֿון צוויי-
טען סאָרט איז אזוי. דער שטארקער ענטהאַלט בערך 0,45%, און דער
שוואַכער ענטהאַלט בערך 0,3%, דער דריטער סאָרט ענטהאַלט „ניקאטין“
בערך 0,25%.

דער גיפֿט „ניקאטין“ ווערט אין מערזיין גערעכענט צווישען די
שטארקסטע גיפֿטען, דרייט או מען זאָל אַרײַן לאָזען פֿון 2 ביז 4 קראָפֿ-
דעם „ניקאטין“ אין די פּיסקלעך פֿון קרוינקעס, קעצלעך אָדער הינדלעך
ווערען זיי געטויט אין אַ קליינע ווילע פֿון 1 ביז 6 מינוט. קליינע
פּויגעלעך קאָנען ווערען געטויט פֿון אַזײַן קראָפֿלע „ניקאטין“ ציט עטליכע
סעקונדען. איראפּעישע וויסע מענשען קאָנען שנעל פֿערגיפֿטען ווערען
פֿון 1/20 גראַם „ניקאטין“. די סימפטאָמען פֿון דעם גיפֿט זענען: ברענונג
אויף דער צינג, זעהר פֿיעל שפּייזעך גיסט זיך פֿון מויל, שטארקער
קאָפּ-וועהטאָג, שלעפֿערונג, ברעכען, ראַקסירען, די הענד מיט די פֿיס
ציטערען און דאָס אָטהעמען ווערט אלע מאָהל שווערער און שווערער,
ביז ... צום טויט.

די ראַקטוירים, וואָס זענען געגען דעם רויכערען, בעשרייבען די
פּאַלנענדע פֿעהלערס: פֿון פֿיעל-רויכערען ווערט דאָס האַרץ אָבגעשוואַכט,
און אויף דער גאנצער גערווען-סיסטעם ווערט וואָס אמאָל שוואַכער, דער
אפּעטיט פֿון עסען ווערט קאָל, עס ברענגט אַדוים אַ צונגען-קאטאָר
און אמאָהל אויף אַ האַלדו-קאטאָר. ווער שמועסט ביי וועמען עס געפֿנט
זיך קליינע ראַנעלעך אין האַלדו אָדער אין די צונגען, איז דאָס רויכערען
נאָך מעהר ביי איהם גיפֿעהרליך, אזוי ווי געוועהנליך ביי אלע גיפֿטען אז
זי קומען אַרײַן אויף אַראַנע האַפּען זי זיך געשווינד אַרײַן אין די בלוט
פֿון אַראַנעס, און אזוי נאָך ווערט נאָר גרינג דער גאנצער אַראַנעס
פֿערגיפֿטעט. דער זשורנאַל „Врач“ ברענגט אַנאַרטיקעל פֿון גרויסען
פּראָפּעטאָר און אויגען-דאָקטאָר „Lacer“ פֿון שטראַסבורג, אז דער רויך
פֿון מאכאק מאכט „קאָל“ די אויגען, און דאָס זעהן ווערט שוואַכער,
בעווייל דער רויך פֿוהרט מיט זיך דעם גיפֿט „ניקאטין“ און אז דער רויך

קומט ארײַן אין די אויגען, ווערקט דער „ניקאטין“ זעהר שלעכט אויף די אויגען-נערווען, וועלכע ווערען וואָס אמאָהל מעהר אָנגעשוואַמט. דער זעלבער פראָפּעסער זאָגט זיך אַרויס, אז מעהר ווי פֿון 5 ביז 10 פאָפּיראַ-סען אמאָג זאָל קיין שום מענש נישט רויכערען. און אויך זאָל מען זיין געוואָרענט אז אין די שטוב ווי עס איז פֿיעל אָנגערויכערט, זאָל מען עפֿענען אַ פֿענסטער, די לופֿט זאָל זיך איבערמישען, בעזונדל פֿון דעם טאָבאַק-רויך ווערט די לופֿט זעהר פֿערדאָרבען.

די דאָקטוירים, וואָס האָבען אלליין לײַעב צו רויכערען, בעשרײַבען וויסער די פֿאלגענדע מעלות פֿון רויכערען: די ענערגיע פֿון מענש ווערט געשטארקט דורך דעם רויכערען, סײַ צו פֿוילישע אַרבעט, סײַ צו גינסטליכע אַרבעט, דאָס רויכערען פֿעריאָגט דעם שלאָף און עס שטארקט די געדאַנקען פֿון קאָפּ. ווען עס זעצט אין קאָפּ אַרײַן צו פֿיעל בלוט, קאָן עס ווערען אַראָפּ געצויגען פֿון קאָפּ אין קערפּער אַרײַן דורך דעם טאָבאַק-רויכערען. דאָס רויכערען פֿעריאָגט די מרה-שחורה פֿון מענש. דאָס רויכערען העלפט צו דעם מענש ער זאָל קאָנען ליכטער האָבען אלע טאָג אַ שטויף-גאָנג. דער טאָבאַק-רויך איז אַ גוטע ריזענפֿעקציע אין מויל. ער פֿערניכטעט די פֿאַראַזיסען מיט די שעדליכע באַקטעריעס וואָס געפֿינען זיך אין מויל און צווישען די ציין, וועלכעס איז שוין געפֿרובֿרט געוואָרען פֿיעל מאל דורך אַ מיקראָסקאָפּ, אז אין שפּײַעכץ פֿון מויל בײַ דעם מענש וואָס רויכערט טאָבאַק, איז שטענדיג דאָ פֿיעל וועגנער באַקטעריעס, ווי בײַ די מענשען וואָס רויכערען נישט. דער זשורנאַל „Спутникъ здоровья“ מאַכט אַסאָ-הבֿל פֿון די אלע מינונגען און קומט צו אזא בעשלוס:

(1) יונגע, אַמאָפּעאלישע, ווייַסע מענשען זאָלען ביז 18 יאָהר זיך איינזאַלמען גאָר נישט צו רויכערען. נאָך 18 יאָהר קאָן מען זיך אָנהויבען צו צוגעוועהנען צום רויכערען. מען זאָל אָנהויבען בײַ 2 פאָפּיראַסען טעגליך, דערנאָך 3, דערנאָך 4 ביז 5. בײַ 5 זאָל מען בלייבען שטעהן. גאָר שטארקע און פֿעטע מענשען קאָנען צו צוהען ביז 10 פאָפּיראַסען טעגליך, אָבער אויף מעהר צו רויכערען לוינט נישט זיך איינצושטעלען אין אַ סבֿנה.

(2) די וואָס ליידען אויף האַרד-קאָסטהאַר אָדער אויף לונגען-קאָסטהאַר אָדער אויף אַסטמאַ, זי זאָלען נישט דערוואַנען זיך צו רויכערען, און זאָלען אויך נישט זיין אין אַנגערויכערטע שטוב.

(3) מען זאָל זעהן אז אַמערדער דער רויך קומט אין מויל אַרײַן, זאָל

ער ווערען דעסמערקט דורך א שטיקעל וואסע, ברי דער שערליכער גיפמ
 „ניקאסין“ וואס ווערען אריינגעזאפט אין דעם שטיקעל וואסע.
 (4) די וואס רויכערען ציגארען, וואלען גישט האלטען דעם בלייזען
 ציגאר אין מויל, נאך זי וואלען רויכערען דורך א ציגארען-שפיץ. און צו-
 לייעב דעם האט דער דאקטאר Koch אויפגעטוהן אזעלכע ציגארען-שפיצלעך,
 וועלכע האבען אינוועהניג גלעזערנע רערלעך מיט שטיקלעך וואסע.
 (5) די וואס רויכערען לילקעס, פליקעס, וואלען זעהן עס זאל ביי זיי
 זיין לאנגע ציבעלעס. בעווייז וואס לענגער דער ציבעל איז, האט גילער
 דער ניקאסין אנאָרס ער וואס בלייבען קלעבען אויפ'ן וועג אין די ווענטלעך
 פון ציבעלעך, אידער ער קומט אין מויל אריין.
 (6) דער מענטש וואס הויפט באלד אן פילער צו שפּייען ביי דעם
 רויכערען, דער וואס אוועקלעגען און גאנצען דאס רויכערען.
 (7) די וואס רויכערען וואלען געדענקען געווארענט צו זיין, גישט צו
 פארזינען דעם רויך אין די לאנגען אריין.
 (8) די בליים פון רויכערען, דהיינו די ציגאר-שפיצלעך, די לילקע-
 ציבעלעס וואלען ווערען אפטר גוט אויסגערייניגט.
 (9) אזא שטוב וואס פילע געסט האבען דארט אָנגערויכערט,
 וואס מען איבערליפּטערען אזוי, אז די לופט וואס ויך איבערטוישען,
 אמבעסטען ווערט דאס געמאכט דורך פּענסטער עפּענען.
 (10) די וואס האבען שוואכע אויגען וואלען גישט רויכערען. און
 זאלגעמיין דארפן זיך אלע רויכערס צו היטען, אז דער רויך פון טאבאק
 אָל זיי גישט אריינקריכען גלייך אין די אויגען אריין.

מישאד. אָדער סוואַנג, האַטש דאָס איז גישט קיין אַנזעהויריגער גילפּט,
 אָבער אין אמת'ן איז דאָס זעהר א שטארקער גאָזאָוי-גילפּט.
 וועלכעס קאן ברענגען גאָר גרינג דעם טוירט אויף דעם פערטשטאדעמען
 מענטש. אטמיינסטענס מאכט זיך דאָס אומגליק דורך אומפארויסניגקייט,
 וואס מען פערמאכט דעם לופט פון די קאך רעהר אָדער פון היץ-אויבען
 רעהר, אידער דאָס האַלץ מיט די קוילען האַבען זיך גוט אויסגעברענט,
 קאן קומט אריין אין דער לופט פון די וואהנונג דער גאז וואס רופט זיך
 סוילען-וויקערע, וועלכעס איז פאַר דעם מענטש א סם המות. דער הויפט-
 דימן פון דעם אומגליק איז די גרויסע קאפ-שמערצען. לויט דעם ערך

ווי שטארק דער משאד איז אין דער לופט, אזוי איז דער ערך פון דעם קאפ-וועהטאג, ביו וואנעט עס דערגרייכט צו אזא קרוינס אז דער פער-משאדעטער פערליהרט דעם פערשטאנד, און ווערט אנשלאפען, אויב מען זאל איהם נישט אבראטיווען בעצייטענס, מיט א עוויגען שלאף. אפטמאהל רופט ארויס דער משאד אז דער פערטשאדעטער ברעכט שטארק. **משאד.** כדי אבראטיווען דעם פערטשאדעטען איז די הויפט רפואה פרישע לופט, און וועלכע עס געפונט זיך פיעל וויער-שטאף, וועלכעס איז א מחיה פאר דעם מענטש. דאס בעסטע איז אינגאנצען ארויס צו געמען דעם פערטשאדעטען פאך שטוב ארויס, און מען זאל איהם אנדער לעהגען אין דראסען אויף דער לופט.

דעם קאפ מיט די שלעפען דארף מען נישט רייבען מיט שטארקען עססיג און מיט אדע-קאלאן, וועלכעס מען בעקומט צו קיפערן אין אפטיק, צו די נאז זאל מען איהם אלע מאהל צו שמעקען א פלעשילע מיט געשמאק-טראפענס.

די פיס מיט די הענד זאל מען איהם אויסרייבען מיט שפריט, צו די לידקעס פון די פיס, דאס הייסט דאס דיקע פלייש פון אונטער די קניגען ביו אראב, זאל מען דארט צולעהגען גארטשיצע, עס זאל אנציהען א גוט רויטקייט.

אז דער קראנקער עפענט שוין די אויגען זאל מען איהם געבען עפעס אין טויל אריין, אזעלכעס וואס רעגט אויף דעם מענטש. דהיינו וויין, אקעוויט, טעה, קאפא. און נאך דעם אבראטעווען דארף ער צו זיין ווייטער אלע טאג אויף דער פרישער לופט, דורך וועלכען די קאפ-שמערצען וועלען געשטולט ווערען.



(ב)

כיס. אויב עס איז אנגעשווארען געווארען דער כיס מיט די ביצים, סיי ביי גרויסע מאנספערזאגען, סיי ביי קליינע קינדער. אפטיק רפואה, צו קיפערן אין אפטיק „באראווי-פליין“ Liq. Burovi. פון דעם

אריינצומוהן איין לעפעל אין אהאלב גלאז קאלט וואסער. אין דעם זאל מען
איינטינקען גאנץ אדער וואס, מען זאל אויסדרינגען אביסעל און צו להגען
צו דעם ביס ארום און ארום אועלכע קאלטע קאמפרעסען. אויף די קאמפ-
רעסען קומט א דין צערטקעלע, און אויף דער צערטקעלע זאל מען פער-
באנדאזשירען מיט טריקענע וואס: אלע עטליכע שעה. אז דער קאמפרעס
ווערט טריקען, זאל מען צו לעהגען א פרישען קאמפרעס.
ביס. אויב דער ביס איז גרויס געווארען, בעווייל עס איז דא דארט
א וואסער. דארף מען זיך ווענדען צו א דאקטאר א חרורג, וועלכער
וועט דאס וואסער מיט א שפריצקע ארויס ציהען.



(ל)

לאקסירען. דאס לאקסירען קאן זיך דערנעמען, אדער פון א פערקיהלונג,
איבער וועלכען עס האט זיך געמאכט א קאטהאר-קישעק.
אדער פון א פערדארבונג, דורך שלעכטע פערדארבענע מאכרים. אויב דעם
קראנקען איז ביטער אין מויל, און ער האט נישט קיין אפעטיט צום עסען,
איז עס פון א פערדארבונג. אויב די סימפטאמען ווענען נישט דא, איז עס
פון א פערקיהלונג. אלוא ווענען די מיטלען, וואס מען דארף מיט זי היילען
די קראנקהייט, אויף נישט ביי יעדען קראנקען גלייך. דא ווי די אורזאכע
פון לאקסירען איז א פערדארבונג, דארף מען געבען אממיינסטענס מיטלען,
וועלכע זאלען אברייניגען די געדערם פון דעם פערדארבונג, דאן וועט זיך
שוין דאס לאקסירען פון זיך וועלכסט אבשטעלען. דא ווי די אורזאכע פון
לאקסירען איז א פערקיהלונג, דארף מען געבען מיטלען איינצוהאלטען, און
מען דארף פון אויסענווייניג צו דערווארימען דעם בויך מיט הייסע וואנעס,
אדער האטש מיט הייסע חלאדעס.

לאקסירען. וועט צייט, דורך די גרויסע היצען קאן זיך מאכען א עפי-
דעמיע פון לאקסירען. און אמאל איז דאס לאקסירען צו-
נאמען מיט ברעכען אויף. און בעווייל די קראנקהייט איז אביסער עהנליך
צו די אויטאטישע חולירע, רופט מען די עפידעמיע מיט דעם נאמען

"חאלירינא". און ביי קלינגע קינדער רופט מען עס "חאלירינקא". ביי דויע פאלען איז דאס גלייכסמע צו ווענדען ייך צו א דאקטאר. אלץ קאן מען ייך נאר ערלויבען איינצוגעבען דעם קראנקען אויף אבליהרען רצין-עהל. צו לעהנען הייסט חלארנעס דעם קראנקען אויף דעם בויך. אדער א בויגען בויכערע-פאפיר בענאסען מיט שפריט, און בעשום מיט געשמויסענעם פעפער, זאך מען צו לענען דעם קראנקען אויף דעם בויך. דא ווי דער נאפעל קומט זאל מען מאכען א לעכעל אין דעם פאפיר, אז דער נאפעל זאל נישט זיין באדעקט מיט דעם שפריט און פעפער. וואס פאר א חלארנעס מען קאן אלץ צו לעהנען צום בויך זעה אויבען "בויך".

ראקסירען. אויב נאך דעם רצין-עהל איז נאך נישט בעסער געווארען דעם קראנקען, קאן מען ייך נאר אלץ ערלויבען איהם איינצוגעבען "ינאזעמציאוי-קראפליס" וועלכע מען קרענט צו קויפען אין יעדער אפטיק Krople Inozemcowe. דאס קאן מען איהם געבען אלע 2 שעה פון 15 ביז 20 קראפליס. אויף קאן מען איהם געבען קאניאק, אריק, הייט-וויין, שווארצע-קאווע, אלע סאָל בוסלעך. מענטא-טעה קאן מען איהם געבען צו טרינקען עטליכע גלעזער מיט צוקער און מיט ציטריין.

לונגען. כדי דער לעזער זאל האבען עטוואס א בעגריף ווי ווייט עס איז גיפערליך א לונגען-קראנקהייט, און ווי אזוי און מיט וואס קאן ייך דער מענטש פֿעהרימען פֿון דעם געפֿעהרליכקייט, מוז מען דעם לעזער עטוואס געבען צו פֿערשטעהן וואס פֿאר א ארבעיט די לונגען האבען צו טוהן אין מעגשליכען קערפער.

דער מענטש דארף פֿארשטעהן אז דאס לעבען מיט דעם געזונד ווערען אונטערנעשטויצט דורך 2 עלעמענטען, וועלכע קומען שטענדיג אריין אין קערפער פֿון אויסוועהניג דורך די 2 האלדז-רעהרען, וואס איינע געהט אריין אין די לונגען. און די צווייטע אין דעם מאָגען. די מאָגען-רעהר פֿיהרט אריין גראַכע עלעמענטען, שפייזען און געטראנקען, וועלכען שטיצען אונטער די גראַכע און הארטע מילען פֿון קערפער. די לונגען-רעהר פֿיהרט אריין ערעלע גאזאווע עלעמענטען, וועלכע שטיצען דאס ערעלסטע פֿון קערפער. דאס הייסט די בלוט, וואס ווערט אָנגערופֿען אין אונזער תורה מיט דעם נאָמען "נפש".

די גאזאווע עלעמענטען רופֿען מיר מיט איין נאָמען "רוּפֿט". אָבער

אין אמת'ן באשטעהט די לופט פון פֿיערליי גאזאזען עלעמענטען וועלכע
רופען זיך מיט די פֿאלגענדע נעמען :

- (1) וויער-שטאף .
- (2) שטיק-שטאף .
- (3) וואסער-ראספף .
- (4) קאהלען-וויערע .

און א געוועהנליכע גוטע לופט דארפֿען זיך די פֿיער עלעמענטען צו
געפונען לויט דעם פֿאלגענדען רעכענונג :

- וויער-שטאף, 20 פראצענט .
שטיק-שטאף 79 פראצענט .

וואסער-ראספף מיט קאהלען-וויערע דארפֿען ביידע צוזאממען מעהר
נישט צו פֿארנעמען ווי איינס פראצענט, דער וויער-שטאף צוזאממען מיט
דעם קליינעם פראצענט וואסער-ראספף מאכען דעם מענש געזונט און
לעבעדיג, בעווייל די בלוט ווערט דורך זיי דערווארעמט און געלייטערט,
איבער וועלכען עס ווערט אויך דערווארעמט דער גאנצער קערפער. איבער
דער שטיק-שטאף מיט די קאהלען-וויערע, אויב זיי טרעטען איבער די
גארמאלע צאהל און פֿארנעמען א גרעסערע פֿארציע אין דער לופט, ברענגען
זיי אויף דעם מענש דעם טויט. דער אפאראט פֿון מעגשליכען קערפער,
וואס ארבייט וועגען דעם, אז די בלוט זאל ווערען דערווארעמט און
געלייטערט דורך דער לופט, איז דאס הארץ מיט די לונגען.

לונגען. אויב די לונגען ציהען אריין אין זיך אומריינע לופט, אין וועלכע
עס געפונען זיך שטויב, אדער שעדליכע באקטעריען פון קראנק-
הייטען, דאן ווערט צום ערשטען די לונגען פֿאראומרייניגט און זיי ווערען
שוואך, נאכהער ווערט די בלוט אויך פֿאראומרייניגט, פון וועלכען עס
קומט אויף דעם גאנצען קערפער א קראנקהייט.

לונגען. לויט ווי מיר האבען אייבען ערקלערט, דארף די לופט צו
ענטהאלטען אין זיך 20 פראצענט וויער-שטאף. דאס איז גאר
גורעם געווארען וועגען די לופט וואס דער מענש אטמעמט אין זיך אריין
אבער אז דער מענש בלאזט צוריק פֿון זיך ארויס די לופט, דאן פֿעהלט
שוין פֿיעל פֿון דעם וויער-שטאף, און אויף דעם ארט פון דעם וויער-שטאף
געפונט זיך שוין גאָר שטיק-שטאף. אלזא קאן מען שוין פֿערשטעהן, אז
דא ווי עס געפונען זיך פֿיער מענשען, ווערט די לופט פֿערדארבעט און

שערדיק, די עצה דערצו איז מען זאל אלע טאהל עפענען די פענסטער, ברי עס זאל קאנען אריינקומען פרישע לופט.

פארקערט איז אבער, ווי עס געפונען זיך פילע בוימער און געוויקסען, דאָרט איז די לופט שטענדיג פריש און געוונד פאר דעם מענש, בעווייז די בוימער מיט די געוויקסען ציהען אין זיך אריין אממניסטעס דעם שטוק-שטאף, פון וועלכען זיי וואקסען ברייט דורך דעם איבער און דער לופט מעהר זויער-שטאף, וואס די בוימער מיט די געוויקסען געבען פון זיך ארויס, און פון וועלכען דער מענש דערקוויקט זיך דאס דעבען. אלוא היסען דאקטוירים די אלע וואס ליידען אויף לונגען-קראנק-היטען, אדער אויף בלוט-קראנקהייטען, אז זיי זאלען נוצען : אוואלד. דאס איז באמת פאר זיי די בעסטע רפואה.

לישוייעס. צו טרוקענע לישוייעס, וועלכע שווענדיון זעהר, אפטמיק-רפואה צו קיפּען אין אפטמיק די 3 מיטלען : 1) יאָדינא פאר

5 קאפ. Tr. jodi puri 2) קוואס קארבולאוו פאר 5 קאפ. Acid. carbolic 3) גליצערין פאר 5 קאפ. Gliceryna. מיט די יאָדינא זאל מען שמירען די לישוייעס אלע מאָג איינמאהל. און פון די אנדערע 2 מיטלען זאל מען זיך אליין מאכען א שמירעכץ, מען זאל אויסמישען 10 קראפּלעס פון קוואס-קארבולאוו מיט 50 קראפּלעס פון די גליצערין אין א קליין פלעשעלע אריין, מען זאל עס אביסעל דערווארעמען וועט עס זיך גוט אויסמישען. און מען זאל מיט דעם שמירען די לישוייעס 3 מאל טעגליך.

לישוייעס. צו לישוייעס וואס נעצען. הויזליכע זאלב, צו דערווארעמען א לעפער אומגעזאלצענע בומער, און מען זאל גוט צוקלאפען אויסמישעכץ פון א פריש הינערען איי. נאכהער זאל מען דאס גוט אויסמישען בירע צוזאמען, און לאזען אביקהלען. מיט דעם זאָר מען שמירען די לישוייעס.

לישוייעס. צו לישוייעס א הויזליכע זאלב. צו נעמען האָניג מיט נאפט מיט דרעגניש, די אלע 3 מינים גלייך אויף גלייך, דאס זאל מען דערווארעמען אויפן פֿייער און גוט אויסמישען. מיט דעם זאל מען שמירען די לישוייעס.

לישוייעס. צו לישוייעס א הויזליכע זאלב. מען זאל אויסמישען א לעפּעל נוסען פראָוואנס-בויסעהל מיט א געלעכץ פון א פריש הינערען

איי, צו דעם זאל מען צו געבען אין לעפעל „גלייט“ מיט אין לעפעל „בלוי“ ווייס דאס אלעס זאל מען צו זאמען גוט אויסמישען, ביז עס וועט ווערען אזוי ווי אַלל. און מיט דעם זאל מען די קרעצלעך שטייערען 3 מאהל טעגליך.

לעבער. לעבער-קראנקהייטען איז פֿערהאן פֿיער מינים. אלץ איז גלייכער ביי אזא קראנקהייט צו ווענדען זיך באלד צו אַ נומער דאָקטאָר. אויב דאָס שלאָפֿקייט איז פֿון גאל-שטיינער שמעהט ווייטער בעשריבען די רפואות צו גאל שטיינער. פֿון הויליכע רפואות איז אמבעסטען צו טרונקען פֿיעל פֿראַוואַנס בוימעהל. אויף צו עסען אלע טאָג 3 אָרער 4 ציטרינען. איינצונעמען אלע נאָכט פֿאַרן שלאָפֿען געהן אַנערד. פֿון 6 קראַפֿלעס טערפֿאָגטין, אַרין געמישט אין אַ האַלב גלאָז מילך **לעבער.** אויב עס שמערצט זעהר אויף די רעכטע זייט ווי די לעבער געפינט זיך, זאל מען צולעהגען הייסע חלדאָנעס פֿון ליאָני שטעין געקאָכט גערעכט אין עססיג.

לעבער. צו-לעבער קראנקהייט. אפטיק רפואה, צו קויפֿען אין אפטיק דאָס קרוםטעכץ „הערבא-חעלידאָני“ *herba chelidonii*. דאָס צו פֿערברען אזוי ווי מײ, און צו טרונקען אלע טאָג עטליכע מאָהל מיט צוקער.



(מ)

מאנען. אויב דער מאַנען איז קאָל געוואָרען, דער מענטש ברעכט אפטיק-רפואה, צו קויפֿען אין אפטיק „וואַלעריאן-קראַפֿלעס“ *Tr. Valerian* מיט „מענטאָווי-קראַפֿלעס“ *Tr. Menthae* אויסצומישען גלייך אויף גלייך, און איינצונעמען אלע 2 שעה 15 קראַפֿלעס.

מאנען. צום ברעכען, דעסטגלייכען אויב עס שלאָגט קעפויער פֿון מאַנען אין מיל אַרין וויערע גאָרען. העלפט פֿיעל מאָהל

אויס צומישען א לעפעלע "טרינקסאדע" *Natr. bicarbonici*. און א דריטעל גראו קאלט וואסער און אויס צו טרינקען. דאס ועלכע צו נעמען עטליכע מאהל טעגליך.

מאגען. צום ברעכען דורך דעם וואס דער מאגען איז פערקוהלט גע-
ווארען. הויזליכע רפואה, צו צולעגען אונטערען הארץ גרינעל
היסע חלאדנעס פון "ליאני-שעמין". אלע 3 שעה א פרישע חלאדנע,
אדער צו צולעהנען דארט גארטשיצע. זיין עסען און טרינקען זאך ווי
קליינע בוסלעך, נישט היים נאך לאהלעך, אדער נאך קאלט. אממנים-
טענס מילך. פאר א טרונק איז גוט איבערצוקאכען אביסער בשם-געגעלעך
אין א קווארט וואסער, צו לאזען אבקהלען, פון דעם וואל ער טרינקען
אלע מאהל בוסלעך. אויב דאס ברעכען איז שטארק און אפער, זעסט
גלייכען אויב דער קראנקער האט היץ, מוז מען זיך באדן ווענדען צו
א דאקטער. איידער דער דאקטער קומט וואל מען איהם געבען צו שלונגע-
קליינע שטיקעלעך אייז.

מאגען. צו שטארקען דעם מאגען ער זאך גוט פערדרייען דאס עסען.
אפטטיק רפואה, צו קויפען אין אפטטיק דאס קרייטעכץ "הערבא-
צענטאוריא" *herba Centauria*. אדער דאס קרייטעכץ "פאלמיללעפאלי
Fol. Millefolii און איינס פון די צוויי קרייטעכצער אריין צו טוהן אין
קאכענדיג וואסער, צוזאמען מיט געטרינקענטע "פאסטעראנצען-שאלעכץ"
און דאס צו טרינקען אלע טאג עטליכע גלעזער אזוי ווי מ'ט מיט צוקער.
מאגען. צו פארבעסערען דעם אפעטיט. אפטטיק רפואה, צו קויפען
אין אפטטיק "קעמאטארטאר" *Kali bitartarici* און פון דעם
צו נעמען אלע טאג אין דער פריה אביסעל אויפ'ן שפיץ מעסער, און צו
פערטרינקען מיט אביסעל וואסער.

מאגען. יעדער מעגש וואס וויל דער מאגען וואל ביי איהם נישט קאל
ווערען. דארף ועהן צו האבען אלע טאג "א שמיל-גאנג".
און דורך דעם וועט ער זיך אויך נאך פעהיטען פון פיעל קראנקהייטען.
וואס איינצונעמען אויף דעם איז דא גענוג מיטלען אין אפטטיק. פון די
גרינגע מיטלען רעכענט זיך פאלגענדע: "בריסם-פילדער", "קארלס-אדער-
זארג", "פארווער-סיי", די שוויטלעך, וועלכע רופען זיך "מוטער-בלעטלעך".
ראמבארטארי. און נאך פיעל ווערעם גלייכען. אבער קיין רציין-עהל"
וואל מען נישט איינגעמען צו לעב דעם.

מאגען. יעדער מענטש דארף וויסען אז דער מאגען ביי דעם מענטש איז

גלחף פונקט אזוי ווי דער קעסעל ביי דער באהן, אויב דער קעסעל קאכט אזוי ווי עס דארף זיין, געהט די באהן גוט. אבער אויב דער קעסעל ווערט נאר עפעס קאל, איז שוין נישט צו ריהרען נאך פון ארט, אלזא דארף יעדער מענטש שמארק אבהיטען דעם מאגען. ערשטענס דארף מען זיין געווארענט נישט צו לעבען ווי א באהמה מיט דעם עסען. נאר מען דארף לעבען מיט א דיעמא. עסען ריינע עסענס, עסען צו דער צייט, רוהען צו דער צייט, געהן שלאפען צו דער צייט.

מאגען. אויב דער מענטש וויל אבהיטען זיין מאגען, ער זאל נישט פערדארבען ווערען דורך די מאכלים, זאל ער אמוענעגכטענס זיין געווארענט אין די 10 פונקטען:

- (1) מען זאל נישט אראבשלינגען קיין עסען, אידער עס איז נישט גוט צו קייערען, און צו ריבען געווארען אין מויל דורך די ציין.
- (2) מען זאל נישט עסען בשעת מען איז אין בעס.
- (3) פלייש זאל מען נישט עסען בארד אין דער פריה, נאר צו מיטמאג.
- (4) נישט אנצולעהגען נאך אפולען מאגען אויף בינאכט.
- (5) ביי אים סעודה זאל מען דעפאיר עסען די ליכטע מאכלים, דערנאך די שווערע.
- (6) מען זאל נישט עסען קיין הייס ברויט, און נישט קיין אומאויסגעבאקען ברויט.

- (7) מען זאל נישט עסען קיין הארמע אייער, נאר לויזע.
- (8) מען זאל נישט עסען קיין אלטע פיש, און נישט קיין אלט פלייש.
- (9) מען זאל נישט עסען קיין פרוכטען אומאבגעשילט, פון אזערבע פרוכטען וואס פועל מענטשען בעסאפען זיי מיט אומריינע הענד.
- (10) מען זאל קיינמאל זיך נישט אנלעהגען קיין פולען בויה, ווי אפרעסער, מען דארף עסען, אבער נישט פֿרעסען. דעסט גלייכען טרונקען משקה, אין וועלכע עס געפינט נאך אכפאהאל, איז אויך גלייכער וואס וועהניגער.

מאגען. אויב עס שלאגט פון מאגען אין מויל אריין וויערע און ברענגען-דיגע נאזען, ביי וועלכען דער מענטש מוז געבען א גרעכץ אדער א שליכערץ. הייליכע מיטעל, צו טרונקען אלע אין דער פריה נאכטערען וויערע-מילך א גלאז. אפטיק-רפואה, צו קיפֿען אין אפטיק טרינק-סאדע *Natr. bicarbonici* און נאך יעדען עסען זאל מען אויסמישען א קליין

לעפֿעלע סאָרע און אַ דריטעל גראָו קאלט וואָסער איבערנעקאָכט, אין
דאָס וואָל מען אַזוי אויסטרינקען, די רפואַה דאָרף מען טוהן אַ לאַנגע צײַט.

מאָזאַל. (הינעראויגען) אויף די פיס, ווערעכעס פֿערשאַפט דעם מענטש
גרויסע שמערצען, אַפּטטיק-רפואַה איז דאָ גענוג מיטלען גרייטע
אין אַרע אַפּטיקען. מיט דעם נאָמען רפואַה צו אַפּטיקעס. הויזליכע
רפואַה איז מען וואָל גוט אויסוויקלען דעם פיס אין וואָרעם וואָסער בערך
אַ האַלבן שעה. דערנאָך וואָל מען צולעהגען אַ פֿענעצעל צימרון צו דער
אַפּטיקע, און מען וואָל פֿערבינדען אַזוי אויף אַ גאנצע נאכט. די רפואַה
דאָרף מען טוהן עטליכע מאָהל.

מאָזאַל. נאָך אַ הויזליכע רפואַה. אַבצושטילען אַ ציבעלע און איינצוויקלען
די ציבעלע אין גוטען עססיג אויף 2 מעה רעה. דערנאָך וואָל
מען פון דער ציבעלע שניידען פֿענעצעלע און צולעהגען צו דעם מאָזאַל
אין פֿערבאנדענעווערען, פון דעם ווערט די אַפּטיקע ווייך און זי שטילט
יך אָב אינגאנצען פֿון פיס.

בוראשקעס. עס פערלויפט זיך, פועל מאַהל אז אין די שפּוואַרקעס
ווי מען האָרט עסענוואַרג קומען אָהן פרודלינג קריינע
מאָדעווקילע (בוראשקעס). צו פֿערטרייבען דעם עולם דאָרף מען צו נעמען
וואַסער, און מען וואָל צו שמויסען קאמפאָר דין זאָ ווי מעהל. און מיט
דעם קאמפאָר-מעהל וואָל מען בעשטען די שמויקער וואַסער. און מען וואָל
די וואַסער אַריינלעהגען אין שפּוואַרקעס אָדער אין די שענקלעך, ווי זי
געפֿונען יך, וועט מען זי פטור ווערען.

מענדעוועסקעס. דאָס איז אַ מיין פאראומען, ווערלעכ פֿערשאַפט
דעם מענטש גרויסע שמערצען, זי קאָפען יך אַרין
מיט די שאַרפע שפּוואַנעדיגע פיסעלעך אונטער די הויט, כדי דער מענטש
וואָל זי נישט קאָנען אַזוי גיך אָבקראַטצען מיט די גענעל, און אַזוי נאָך
האַלבען זי יך פֿעסט, און זי גאָנען אויס פון מענטש נור בלויז פֿעמיג-
קייט, פון וועלכען עס האַפט אַן אלע מאַהל דעם מענטש אַ שטארקע

שווענדעני, און אזוי ווי זי האבען לייעב זיך צו באזעצן אממניסטענס
אויף די נעשרעכטס-גלידער, שעהמט זיך דער מענטש דאָרט אלע מאָהל
צו קראַמפּען. די הויפט רפואה-צו דעם איז ריינקייט, דער וואָס האַלט זיך
ריין און וואַשט זיך אָב אלע מאָהל מיט ווייץ, דער ליידעט נישט פון די
פאַראַוויטען. כדי צו פערניכטען די אומגעזעממענע געסט זאָר מען קויפּען
אין אַפּטיק „שאר-מאשין“ אָדער לאַוואַנדול-עהל ol lavanduli און מיט
דעם אָן צו שטירען עטליכע מאָהל, נאכדער אָב צו וואַשען מיט ווייץ,
אזוי נאך ווערט מען זי פֿטור.

מענער-שוואכהייט. די בעסטע רפואה-איז, נישט אָב צו שוואכען
זיך מיט קיין שווערע אַרבעט, נאָר נישט צו
זאָרען, גוט צו עסען און גוט צו טרינקען, שפּאַצירען צו געהן אלע טאָג
אויף פֿרישען לופט. און אויך צו באַדען זיך אלע טאָג אין אַקאלט
וואַסער, אָדער צו מאַכען זיך אלע טאָג אין דער פֿריה אַקארטע וואַנע.
מענער-שוואכהייט. הויזליכע רפואה, צו קויפּען אַ גוט פּלעשעל
וויין בערך פון אַקוואַרטיעל. אַריין צו טוהן
אין דעם פּלעשעל וויין איין גראָן פּיועס, וועלכעס מען קריגט צו קויפּען
אין אַפּטיק, פון דעם וויין צו טרינקען עטליכע וויין-גלעזלעך איבערן טאָג.
מענער-שוואכהייט. אַפּטיק-רפואה, צו קויפּען אין אַפּטיק דאָס
קרייטעכץ וואָס מען רופט „אַקסען-צינגען“
דער ליטיינישער נאָמען פון דעם קרייטעכץ איז „הערבאַ-אַספּערגיניס“
herba asperuginis דאָס קרייטעכץ זאָר מען ווינקען דריי טאָג אין גוטען
שטארקען וויין. פון דעם וויין צו טרינקען עטליכע וויין-גלעזלעך איבערן טאָג.
מענער-שוואכהייט. אַפּטיק-רפואה, צו שטירען אלע טאָג דאָס
אבר מיט „שפינגארד-עהל“. דער דויטשישער
נאָמען פון דעם עהל איז „אַהרי-לעוואַנדולי“ oli Levanduli מען דארף
אָדער בעמערקען אז דער עהל ווערט אויף פּיעל ערטרע נעפּעלשט.
אלוז דארף מען דאָס קויפּען נאָר אויף אַרעיעל אָרט.



(ג)

נאז. נאז-קראנקהייט איז פֿערהאן פֿערשוערענע מיט די פֿאָלגענדע נעמען:
שקראַפֿעל, פֿלוס, סיפּיליס, פּאָליס און נאָז-קאטאר. ביי די אלע
קראנקהייטען פֿערלירט דער מענש דעם חוש הריח. און ביי מיר פון זי
קאן ער פֿערלירען די גאנצע נאָז אויף. אלוואַ דארף מען זיך ביי די אלע
ערשטע קראנקהייטען צו ווענדען צו א נאָז-דאקטאָר. אויסער ביי די
לעצטע קראנקהייט נאָז-קאטאר, קאן מען זיך אליין קורירען.

נאז. צו א נאָז-קאטאר, אפּמייק-מיטעל. מען זאל קויפֿען אין אפּטיק
"קאלי-כלאָריקום" Kali chloricum. און מען זאל נעמען אביסער אויפֿין
שפיץ מעסער און אריין מיטען אין א האלב גלאָז קאלט וואסער. אז די
קאלי איז שוין צולאָז געוואָרען זאל מען דאָס גוט אויסמישען, און מען
זאל פון דעם וואסער ארויף גיסען אויף א קליין טעצעלי, און דער
קראנקער זאל מיט די נאָז אריינציהען דאָס וואסער פון טעצעלי אין די
נאָז אריין און זאל ארויסלאָזען דאָס וואסער דורך'ן מויל, אזוי זאל ער
טוהן עטליכע מאל אין טאג.

נאז. צו א נאָז-קאטאר. הייזליכע רפואה, דער קראנקער זאל ברענען
פעניס ביי א ליכט, און ער זאל דעם גערוך פון די פעניס
אריינציהען אין די נאָז אריין. ווען די פעני ווערט פֿערלאָשען דאן געהט
מער דער גערוך, דאָס מיטעל זאל ער בעניצען עטליכע מאָל טעגליך.
נאז. צו א נאָז-קאטאר. אפּמייק-רפואה, צו קויפֿען אין אפּטיק הערץ-
שטארק, וועלכעס רופֿט זיך נאשאמיר-ספּירט, און אויף ליטמין
הייסט עס Ligu ammonii caustici, צו דעם זאל דערקראנקער אלע מאָל
א שטעק טוהן, האלמענדירג דאָס אין א גוט פֿערשטאָפט פֿלעשעלע.
צייט 3 טעג וועט ער געהילט ווערען.



(ד)

פאדאגרא. די קראנקהייט איז עהנליך צו רעומאטיזם, נאר דאָס איז
מיט געשווילעכץ. אממאנסמענס שטעלט זיך אָב די

קראנקהייט ביי די פֿיס. די גראַבע פֿינגער מיט די קנעכלעך ווערען
געשוואַרען. און ביי דעם טריט שמעכט, ואָ ווי מיט שפּילקעס.
פאָדאָגראַ. רפואה צו די קראנקהייט איז, צו מאַכען בלאַטע-בערער
צו דעם פֿיס. אמבעסטען איז פֿון משאָחאָניסקע שלאָם.
וועלכעס מען בעקומט צו קויפֿען אין אפּטיק. אויך איז גוט אויסצו-
מישען פֿליין-באָראָווי Lique.Burowi. האַלב אויף האַלב מיט וואַסער, און
דאָס אַריינצומאָן אין פֿיינט ליים, מען וואָל עס גוט אַ דורך מישען.
און צו לעהגען צום פֿיס, אָדער מען וואָל אַריינשמעקען דעם פֿיס אין
דעם ליים אויף אַ האַלבן שעה. נאָכהער וואָל מען דעם פֿיס אַבריינגען
מיט וואַרעם וואַסער און בעשמירען מיט קאמפֿאָר-עהל oli Camphor.
און פֿערבאָנדעזשירען. דאָס וועלכע דארף מען טוהן 2 מאל מעגליך
עטליכע וואָכען.

פאָדאָגראַ. דאָ ווי קיין אפּטיק געפֿינט זיך נישט, מען וואָל קאָנען
קויפֿען די אויבענדערמאָנטע מיטלען, מוז מען זיך
באהעלפֿען מיט היימישע הויזליכע מיטלען. אויף דעם אָרט פֿון
באָראָווי-פֿליין קאָן מען געמען געוועהנליכען עסיג. און אויף דעם אָרט
פֿון קאמפֿאָר-עהל קאָן מען זיך מאַכען אַ הויזליכע וואַל. מען וואָל
געמען 2 גאלען פֿון בהמות און אַריינגיסען אין אַ מעפעלע. צו דעם
וואָל מען צו מישען אַ גרויס קאָווי-לעפֿעלע וואַץ, דאָס וואָל מען דער-
וואַרמען ביי דעם פֿייער און גוט אויסמישען, אז דאָס וואַלץ וואָל צו-
נעהן. אין דעם וואָל מען איינמינקען טיכעלעך און צו לעהגען. פֿון
אויבען וואָל מען פֿערבאָנדעזשירען מיט וואַסער.

פּאָקען. דאָס איז אַ קראנקהייט, וועלכע האָט געפֿלעגט צו געמען
יעהרליך נישט ווייניגער פֿון הונדערט טויזענד קרבנות. אזוי
אנשטעקענדיגע קראנקהייט ווי פּאָקען איז, געפֿינט זיך נישט דאָס
צווייטע. נאָר אַראָנק דעם גרויסען דאָקטאָר Jenner פֿון ענגלאַנד.
וועלכער האָט אויפֿגעטוהן צו שמעלען יעדען מענטש קוה-פּאָקען, נאָך
ווען ער איז נאָר אַ קליין קינד. דורך די עצה איז די פּאָקען-עפֿידעמיע
אין גאנצען פֿערניכטעט געוואָרען, און היינט ווי די קראנקהייט האָט
אָרט אָנצוהאָפֿען זיך, איז דער מענטש אליין שוואַך אין דעם, בעווייל
ער האָט פֿערשפּעטיגט צו שמעלען פּאָקען. אין דאָ ווי די קראנקהייט

חאפט ויך אמאָהל אָן און אַמעניש וואָס מען האָט איהם יאָ געשטעלט
קוה-פּאָקן קלינגערהייט, און אויף דער מעניש ועלכסט שוידרונג, בעוויל
יעדער מעניש דארף ויך שטעלען 3 מאָהל פּאָקען. אלע 10 יאָהר דארף
מען ויך לאָזען ווידער שטענען פּאָקען. אזוי נאָך קאָן דער מעניש זיין
פאַרוואַקערט פֿון די קראַנקהייט, וואָרען אַפילו און די קראַנקהייט חאפט
ויך אמאָהל אָן ביי אונז מעניש, און די קראַנקהייט אַ שוואַכע, און על
פֿי רוב נישט געפֿעהרליך.

פּאָקען. עס איז פֿעהראָן אַ פּאָקען-קראַנקהייט, וועלכעס מען רופֿט
ווינגט-פּאָקען. דאָס איז קינגמאָהל נישט געפֿעהרליך. די
קראַנקהייט קאָן ויך טרעפֿען ביי יעדען מעניש דורך אַ פֿערקיהלונג,
אָדער דורך דעם וואָס ער האָט אָנגעדרייבען טרינקען שלעכט וואַסער,
וועלכעס ער איז נישט געוואָהנט געווען צו טרינקען. די קראַנקהייט
געוויקערט נישט מיין ווי אַזוי וואָך, ווערט דער מעניש געוונד.
פּאָקען. ביי די פּאָקען-קראַנקהייט מוז מען ויך ווענדען צו אַ דאָקטאָר.
חאָטש קיין רפואה צו די קראַנקהייט איז נישט דאָ, אָבער
דאָך קאָן דער דאָקטאָר פֿעהרמיטען דעם קראַנקען פֿון פֿיעל צרות און
יסורים.

פּאָקען. בשעת די קראַנקהייט, איז נישט צו געבען דעם קראַנקען צום
טרינקען, קימס, וועלכעס ווערט געמאכט פֿון קאָבילע
מילך. צום פֿערגרינגען די שווענונג און צו פֿעהרמיטען דאָס פנים עס
וואָל נישט בלייבען אזוי פֿיעל גריבלעך, איז נישט צו שמירען די פּאָקען
מיט מאַנדעל-עָהל oli amygdali, און אויף צו שוטען מיט רייז-פֿודער.

פּאָרד. די גרעסטע אורזאָכע פֿון דער אומריינע קראַנקהייט, זענען די
האַר פֿון קאָפּ. אונטער דער וואַרצעל פֿון יעדער האָר געפֿינט
זיך דער גיפֿט פֿון די קרעץ. אלזאָ קומט אויס אין פֿיעל פֿאלען פֿון
דער קראַנקהייט און מען מוז אויסצופֿען איינציגווייז מיט אַ קליין צווענגע-
לע אלע בייזע האָר פֿון קאָפּ. און אויף אלע פֿאלען טאָר מען נישט
לאָזען וואַקסען קיין לאַנגע האָר אויפֿ'ן קאָפּ, אויב נישט אויסצופֿען וואָל
מען האָט זי אלע מאָהל גאָר נידריג אַבשערען, אזוי נאָך איז אליין
גרינגער צו היילען דעם קאָפּ.

פאָרד. אפטייק-רפואות און זאלבען איז דאָ גענוג צו דער קראנקהייט.
נאָר בעווייז דער האַראַקטער פֿון דער קראַנקהייט און נישט
ביי אלע מענשען גלייך, קאָן מען נישט בעשטיממען פֿאַר יעדען קראַנקען
א גלייכע רפואה. אַלזאָ איז דאָס גלייכסטע ביי דער קראַנקהייט צו
ווענדען זיך צו אַ גוטען ספּעציעלען הויט-דאָקטאָר. און די לעצטע
צייטען האָבען די הויט-דאָקטוירים אָנגעהויבען איינצופיהרען הייל-אנשטאל-
טען פֿאַר אַזעלכע קראַנקע צו היילען זיי מיט עלעקטרי-שטראַלען.
פאָרד. ביי קליינע קינדער און די קעפלעך ווערען אויסגעשויט מיט
געשווינדען, פֿון וועלכע עס רינט אייטער. קאָן מען זיך אליין
מאַכען צו דעם אַזאַל פֿון אפטייק-מיטלען, מען זאָל קויפען אין אפטייק
פולווער-בור-ווייערע *Pulv. acidi borici* און אויף שוועבסל-פולווער
Pulv. Sulfurici. מען זאָל דערוואַרמען ביי דעם פֿייער 4 לעפֿעל
וואַסער-אָנז *Vasellini*. אָדער 4 לעפֿעל אומגעזאלצענע בויטער, אָדער 4
לעפֿעל אומגעזאלצען חויר-פֿעטען. און דעם זאָל מען אַריינמישען אין
לעפֿעל בור-ווייערע פולווער און איין לעפֿעל שוועבסל-פולווער, דאָס נוס
אדורך צו מישען ביז עס וועט ווערען אזוי ווי אַזאַל, און מיט
דעם צו שטירען דעם קינדס קעפֿעל 2 מאָל טעגליך. די האַר פֿון די
אומריינע קעפלעך זאָל מען נישט ראָוען וואַקסען, נאָר אלע מאָל
אַבשערען.

פֿיבער. צו אַ געווענהליך קחחת, דאָס הייסט דער וואָס בעקומט
דאָס פֿיבער אלע מאָג אין איין צייט, צופֿויער שוידערט
איהם אויס אַ קעלט אין די בריינער. נאָכהער בעקומט ער הייסען, און
שוויצט זיך איבער און הויבט זיך אויף געוונד. צו דעם איז די
בעסטע רפואה, דערפֿויער איינצונעמען אויף אָפֿיהרען. אין דערנאָך
זאָל ער אייננעמען חינוּ-פֿראַשקעס *chinin muriati*. עס זאָל זיין פֿון 3
ביז 5 גראַם אין איין פֿראַשיק. אַזעלכע פֿראַשקעס זאָל דער קראַנקער
אייננעמען 3 אַמאָל. און ער וועט אזוי געמען 9 פֿראַשקעס במשך אין 3
מאָג וועט ער געוונד ווערען.

פֿיבער. עס איז אָבער פֿערהאן נאָך פֿיעלערע פֿיבערס, דהיינו
וועלכע קומען אָהן אלע 2 מאָג און וועלכע קומען אָהן אלע
3 מאָג און אויף פֿון אלע 4 מאָג. די מינים פֿיבערס קאָנען שוין זיין

אמאָהל געפֿעהרליך. אַלואַ ביי דיעזע פּיבערס מוז מען זיך שוין ווענדען
צו אַ דאָקטאָר. עס איז פֿערהאָן אַ מיין פּיבער, וועלכעס רופט זיך
פּויל-פּיבער, דאָס איז זעהר אַ געפֿעהרליכע קראַנקהייט. אַלואַ וואָל מען
ביי אַ זעלכע פֿאלען נישט וואַרטען, נאָר באַד ווענדען זיך צו אַ דאָקטאָר.

פּיס-וועהטאָג. פֿיס-קראַנקהייטען זענען פֿערהאָנגען עטליכע מינים:

(1) שוואַכהייט, וואָס די פֿיס שמערצען נישט, נאָר

זי זענען שוואַך, דער מענטש ווערט באַלד מיט שטענדיג.

(2) שמערצען אין די פֿיס פון רימאטען.

(3) שמערצען אין די פֿיס פון פּאָראַגראַ.

(4) שמערצען אין די פֿיס פון אַ גערווען-ווייטאָג.

(5) שמערצען אין אַ פֿיס פֿון אַ גערווען-ווייטאָג מיט זעהר אַ שאַרפען
האראקטער פֿון אויבען בוז אַראָב, וועלכעס די קראַנקהייט ווערט אָנגע-
רופֿען מיט דעם נאָמען „ישאָס“.

פּיס-וועהטאָג. צו פֿיס-וועהטאָג פון אַ גערווען-שוואַכהייט, אָדער צו

פֿיס-שוואַכהייט אָהן שמערצען איז גוט צו מאַכען

זאָלץ-בעדער. קענען שוואַכהייט פֿון די פֿיס, הויזליכע רפואה. אויס

צו שמירען די פֿיס עטליכע מאָהל איבער די וואָך מיט נאָפט. צו פֿיס-

וועהטאָג פון רימאטען און פּאָראַגראַ זעה „רימאטען“ און זעה „פּאָראַגראַ“.

צו פֿיס-וועהטאָג פון אַ שטארק גערווען-ווייטאָג איבער דעם גאנצען פֿיס,

וועלכעס רופט זיך „ישאָס“ מוז מען זיך ווענדען צו אַ דאָקטאָר. אין

פֿיעל פֿאלען העלפט נישט צו דעם קיין שום רפואה, נאָר מען מוז

דעם פֿיס ערקעמערן ווערען.

פּיס-וועהטאָג. צו אַ „ישאָס“. פון הויזליכע מיטלען בעניצט מען

זיך מיט מאַסאָזשירען דעם גאנצען פֿיס מיט שטארקע

שפּירטיסען, דהיינו גאָרטשיצאָווי שפּירט, קאמפּאָר שפּירט, מראָוטישאָווי

שפּירט. אָדער טערפּאָנטיין צוזאממען געשטעלטען מיט האָלץ-שפּירט,

האלב אויף האַלב. עס איז נאָך פֿערהאָנגען הויזליכע מיטלען צו אַ

„ישאָס“, וועלכעס קאָן אויף אמאָהל העלפען מען צווייבט שוואַרצען

רעטעק גוטען אויף אַריב-אייזען, און מען שמירט עס אָהן אויף אַ לאַנג

מיט, און דאָס לעהנט מען צו צום פֿיס איבער די גאנצע לענג ווי

די הויפט-ווערסטאג איז. דאס בעסטע אבער פון די הויז-מיטלען איז.
מען נאך צו לעהנען הייס וואס.



(צ)

צוקער. עס איז פֿערהאן אויסע קראנקהייט, וועלכע איז ביסער נא ווי
נא. דאס הייסט „צוקער-קראנקהייט“. די קראנקהייט
באשטעהט פון דעם, אז די פֿלייסעקייטען, וואס ווערען אויסגעארבעיט
אין קערפער דורך די שפיזען וואס דער מענטש עסט, ווערען איבערגעדרייט
אויף צוקער, און דער צוקער געהט ארויס פון קערפער מיט דער אורין,
איבער וועלכעס דער קערפער ווערט געהר שוואך און הייבט אן צו
דאהרען. ביי דער קראנקהייט הייבט אויך אן דער האלדז פֿון אינוועניג
צו טרינקענען, אין מויל ברענט שטענדיג, דאס הארץ חלשת שטענדיג
און די אורין געהט צו פיעל. אז עס פאלט אראב א טראפען אורין אויף
דעם שטיוועל און עס ווערט פערטריקענט, בלייבט א ווייטער פלעק
אויף דעם ארט. דאס ווייטקייט בעווייזט אויף דעם צוקער וואס געפֿינט
זיך אין דער אורין.

צוקער. ביי דער קראנקהייט מוז מען זיך ווענדען צו א דאקטאר.
עס איז אפילו דא אפטמאק-רפואות געגען די קראנקהייט,
אבער די בעסטע רפואה איז צו פֿאהרען נאך „קארלסבאד“.

צוקער. ביי דער קראנקהייט מוז מען זיין שטארק אבגעהיטען פֿון
צוקער און פֿון אלע ויסע שפיזען. אויף דעם ארט פֿון

צוקער דארף מען זיך בענוצען מיט „סאחארין“. אויך דארף דער קראנקער
זעהן ווי ווייט מעגליך איז אויס צו מיידען די שפייזען וועלכע ענטהאלט
מען אין זיך פֿועל קראכמאל, דהיינו אלע שפייזען וואס ווערען געמאכט
פֿון מעהל, קארמאפֿעל, רייז, זיסע פֿרוכטען, זיסען וויין, ביער. פֿון
דעם אלעם זאל זיך דער קראנקער דערווייטערען, א קיין שטוקעל
זעמל איז ערלויבט צו עסען נאָר מיט פֿלייש צוזאממען. דאָס איז
אליי צוליעב דעם בעווייל פֿון די אלע קראכמאל-שפייזען ווערט אין
קערפֿער אויסגעארבײט דער צוקער.

דער קראנקער דארף ביי דער קראנקהײט צו עסען אממײנעסטענס:
פֿלייש, אײער, קעז, בוסער, וויערע-מילך, קאפֿע, טיי מיט
סאחארין, אויף שארט גישט וועהניג רוים-וויין.

ציין. ציין-וועהמאג איז פֿעהאן דריי מינים: (1) פֿון דעם וואָס עס
געפֿינט זיך אין דער צאָהן א לעכילע. (2) פֿון א פֿערקוהלונג.
(3) פֿון דעם וואָס די געווען ווערען אמאָהל שטארק אויפֿגעקענט ביי דעם
מעגש, פֿון א עגמת נפש, פֿון א שרעק, פֿון א בעס, פֿון א גרויסע
תאווה צו א זאך, וועלכעס דער מעגש קאן נישט גרייכען דערצו.

ציין. צו ציין-וועהמאג דורך דעם וואָס די ציין זענען געלעכערט, איז
דאָס גלייכסטע צו ווענדען זיך צו א ציין-דאָקטאר, דאנטיסט,
וועלכער קאן דעם צאָן פֿערפלאַמבירען, דורך וועלכען דער צאָהן
ווערט צוריק געוונד, אזוי ווי דערפֿויער. די פֿערפֿוילטע ציין וואָס מען
קאן זי שוין נישט פֿערפלאַמבירען, דעסמגליכען די פֿיעניס, דארף מען
לאָזען ביי דעם דאנטיסט ארויס נעמען, וואָרען אויב נישט קאן זיך נאָך
מאכען מאטעריע אין די זאגשליס. דאָ אָבער ווי מען קאן נישט בעקומען
קיין דאנטיסט מוז מען היילען די ציין מיט קראפֿלעס. מען נעמט א קליין
שטיקעלע וואַס, אזוי ווי א ארביס גרויס, מען טונקט עס אין
איינעם פֿון די שטארקע קראפֿליס, און מיט א ריין שפּויעל שטייבט מען
עס אריין אין לעכעלע, ווערט די וועהמאג באלד געשטילט.

ציין. די פֿאלגענדע קראפֿלעס קאן יעדער בעקומען צו קיפֿען אין
אלע אפטיקען:

Fr. jodi, puri.

(1) יאָדינא קראפֿלעס.

Liquir acidi carbolici.

(2) קארבאָל־אײזע קראַפערס.

oli Caryoph.

(3) נעלקען-עװל.

בײַ די שטארקע קראַפערס דארף מען היטען נישט אָנצורירען די צינג מיט די זאגשליס, בעוויל די הויט ווערט אָבערברוהט.

ציין. אויב דאָס לעכעלע פון צאהן איז גרויס, און עס געפינט זיך אין אַ הינטערשטען צאהן, קאָן מען אריין לעהנען אַ קרויסקולע קאמפאָר, אָדער אַ קרויסקולע סאלמיאק, אָדער עטוואָס געמאלענע וועש-סאָדע. די מיטלען קאָנען אויך איינשטילען די ציין-וועהטאָג.

ציין. דער וואָס האָט געלעכערטע ציין מיט פיעניס, איז זעהר גוט ער זאל אלע מאָהל דויענפֿעקצירען די ציין מיט דעם וואָס ער זאָג מיט אַ ציין-בערשטעלע אויסרייבען די ציין, מיט טרינק-בראָנפֿען.

ציין. בײַ שלעכטע ציין און פיענקעם שפירט מען פֿון מויל אַ שלעכטען ריח. אפטיק-רפואה, צו קויפֿען אין אפטיק, קאל-הילף-ציין.

Kali chlorici. אריין צו מישען 2 קאָווי לעכעלעך אין אַ גלאָז וואסער, ווען די קאל איז שוין צולאָזט געוואָרען אין וואסער, זאל זיך דער מענטש שווענקען דאָס מויל מיט דעם וואסער עטליכע מאָהל טעגליך.

ציין. אויב די אורזאָכע פֿון די ציין-וועהטאָג איז אַ פֿערקוהלונג, דארף מען קויפֿען אין אפטיק גארמשיצא-שפירט Spirit Sinapis.

באמפאָר-שפירט Spirit camphor. און אויס צו מישען 2 טייל גארמשיצא-שפירט מיט אַיין טייל באמפאָר-שפירט. אין דעם זאל מען איינטינקען אַ שטיקעל וואס איז איינרייבען פֿון אויסענווייניג די באַק מיט די גאָמבע

פון דער זיט ווי די וועהטאָג איז. דערנאָך זאל מען פֿערבאנדענשויען מיט וואס. אויך איז גוט אין דעם פֿאל צו דער ווארימען מאנדעל-מילך

מיט צוקער, און דער קראנקער זאל אלע מאָהל נעמען אַ פֿול מויל פֿון דער ווארעמע מאנדעל-מילך, און זאל אזוי האלטען די מילך און מויל

עטליכע מינוט. און דער נאָך זאל ער די מילך אויסשפּיען. אויך איז אין דעם פֿאל גוט צו צולענען הייסע קאמפּרעסען אָדער הייס אש צו דער

באק ווי די וועהטאָג איז.

ציין. אויב די אורזאָכע פֿון ציין-וועהטאָג איז אַ נערווען-אויפֿרעגונג, איז גוט איינצונעמען איבערען מאָג דריי פראַשקעס היינ

chinin muriatici פֿון 3 ביז 5 גראַם אין אַיין פראַשק. אָדער ער זאל זיך ווענען צו אַ נערווען-דאָקטאָר, וועלכער וועט איהם פֿערישרייבען

איינצונעמען קאל בראָמאט Kali bromati.

ציון. אויב איינער וואָהנט דאָ ווי קיין דאָקטאָר און קיין אפּטייק געפֿינט
זיך נישט, קאָן ער זיך אַרײַן מאַכען קראַפּלעס צו געלעכערטע צײַן,
מען נעמט אַ האַלב לױט בשם-געגילעך, אַ האַלב לױט געשטויסענעם
כאַמפּאָר, דאָס טוט מען אַרײַן אין אַ פֿלעשילע. און מען גיסט אַרױף
אַביסעל שטאַרקען אַקעוווט-שפּורט, נישט פֿיעל נאָר עס וואָל אַריבער
געהן העכער ווי די 2 מיטלען. נאָך 24 שעה ווי דאָס ווײַקט זיך צו=
זאַמען, זענען שוין די קראַפּלעס פֿערמיג.

ציון. אויב די צײַן שאַקלען זיך, בעווייל דאָס פֿלייש פֿון די יאסרעס
איז ווײַך און שוואַך. הויזליכע רפּואה, אויסצומישען אַ האַלב
גראַם געריבענעם חרדן מיט אנדער־האַלבן גלעזער ביריש-בײַער. דאָס
וואָל מען אַרײַן טוהן אין אַ גרויסע פֿלאַש, מען וואָל דאָס גוט אַ דורכמישען,
גוט פֿערשטאַפּען, און אוועק שטערען. נאָך 24 שעה איז די רפּואה שוין
פֿערמיג. מען נעמט דערפֿון אַראָב אלע מאָל אַביסעל אין אַ גלעזעל
אַרײַן און מען שווענקט איבער די צײַן. דאָס דאַרף מען טוהן 3 מאל טעגליך.
אַפּטייק-רפּואה, מען וואָל קויפּען אין אפּטייק 2 חלקים יאָרינגא,
מיט איין חלק גרינצעריןא. דאָס וואָל מען אויסמישען גוט, און 2 מאל
טעגליך וואָל מען מיט דעם אויסשמידען גוט די יאסלעס פֿון אַלע
זיטען.



(ק)

קאנקול-הוסט. אַדער קאָקלױש. דאָס איז אַ הוסט וואָס משעפֿט זיך
אָן נאָר בײַ קלײַנע קינדער. און דאָס איז זעהר
אַ אנשטעקענדיגע קראנקהײט, עס שפּרינגט זאָ ווי אַ פֿייער פֿון איין קינד
אויפֿען צווייטען. אַלזאָ אין אַ שטוב ווי עס געפונט זיך עטליכע קינדער,
אויב איינס איז קראַנק געוואָרען אויף אַ קאנקול-הוסט, וואָל מען זעהן באַלד
די רעשט קינדער אַרויס צו נעמען אין גאַנצען פֿון די וואָהנגא.

קאנקול-הוסט. קיין זיכערע ספעציעלע רפואה צו א קאנקול-הוסט איז נאך בין הינט נישט צו געפונען אין די דאקטאר-בוכער. נאר די ערשטע און בעסטע רפואה איז, צו זיין מיט דעם קינד אויף דער פרישע ליפט עטליכע שעה אלע מאָג. ווען דאָס קינד איז אין שטוב, זאָל מען עס בעשפּריצען אלע שעה פֿון פּאַרענט אויף די מלבושים מיט קארבולאָווי-וואַסער. און אויף ווי דאָס קינד שלאָפט בינאָכט צו ביטאָג זאָל מען אלע מאָהל געבען דעם קינד בעשפּריצען מיט קארבולאָווי-וואַסער, אזוי אז דאָס קינד זאָל אין זיך אַרײַן אַטעמען דעם ריח פֿון קארבול.

קאנקול-הוסט. אפטיק-רפואה, צו קיפּען אין אפטיק ברוסט-טייט *species pectorales*. דאָס צו קאָפּען מיט מילך און מיט קאנדעל-צוקער און פֿון דעם צו געבען דעם קינד אלע מאָהל צו מרינקען אזוי ווי טיי.

קאנקול-הוסט. הויזליכע רפואה, מען זאָל צו שטויסען איהן לויט קאנדעל-צוקער אזוי דין ווי מעהל, און מען זאָל קיפּען אין אפטיק געמאלענעם שוועבעל א האלב לויט. די אנדערע אלעבן לויט זאָל מען גוט אויסמישען צו זאממען. פֿון דעם זאָל מען געבען דעם קינד אויפֿן שפיץ מעסער אפּיסעלע 2 אָדער 3 מאָהל טעגליך, לויט די יאהרען פֿון קינד. דאָס קאָן מען איינגעבען דעם קינד אַרײַנגע-מישט אין וואַרעמע מילך. אָדער אויף אַעס-לעפּעל מילך, אָדער אויף אַ קאווע-לעפּעל מילך, אַלץ לויט די יאהרען פֿון דעם קינד.

קאפוועהטאג די שמערצען וואָס דער קראנקער שפּיהרט אין קאָפּ, איז אַממיינסטענס די אורזאכע דערפֿון עפעס אַ קראנקהייט פֿון קערפּער, די קראנקהייט פֿון קאפוועהטאָג קאָן מען צו טיילען אויף זיבען אַרטען:

- (1) פֿון מאָגען. דורך דעם וואָס דער מאָגען איז נישט אין בעסטען אָרדנונג, שלאָגט פֿון מאָגען אין קאָפּ אַרײַן שלעכטע גאווען, וועלכעס די געהירען קאָנען נישט פֿאַרנעמען, איבער דעם שמערצט דער קאָפּ.
- (2) פֿון הויט. בעווייז עס געפֿונט זיך אין קערפּער אַ קראנקהייט, פֿון וועלכען דער קראנקער בעקומט הויט, און די הויט זעצט אין קאָפּ אַרײַן אויף די געהירען, איבער דעם שמערצט דער קאָפּ.

(3) פֿון אַ פֿערקיהלונג וואָס דער קערפּער איז פֿערקיהלט געוואָרען .
האַט דער מענטש בעקומען אַ קאַטהאַר, פֿון וועלכען דער קאָפּ שמערצט .

(4) פֿון אַ גערווען-פֿערשוועכונג

(5) פֿון אַ בלוט-שלאַג, וואָס עס זעצט פֿון קערפּער אין קאָפּ אַרײַן
צו פֿיעל בלוט .

(6) פֿון דעם וואָס דער מענטש איז אַרױם-בלוטט . דאָס הייסט ער האָט
וועהניג בלוט אין קערפּער, זענען די געהירען טריקען און דאָר .

(7) פֿון קאָפּ-קראַנקהײַט, דהיינו דער קאָפּ האָט געקריגען אַ קלאָפּ,
דורך וועלכען עס זענען קאלל געוואָרען די געהירען אויף איין אָרט, אָדער
אז אַ חלק פֿון קאָפּ האָט די קראַנקהײַט וואָס ווערט אָנגערופֿען „מיגרענאַ“ .
און בעווייל יעדער קאָפּ-וועהטאָג האָט אַ אנדערע אורזאכע, אַלזאָ אז מען
וויל היילען קאָפּ-וועהטאָג, דארף מען זײַן דערפֿויער אַ מבין, מען זאָל
וויסען די ריכטיגע אורזאכע, דאָן קאָן מען וויסען וואָס פֿאַר אַרפּואה
צו געבען .

קאפּוועהטאָג. אויב די קאָפּ-וועהטאָג איז פֿון היטץ, דארף מען
צו לעהגען קאלטע קאָמפרעסען פֿון וואַסער מיט
עססיג, אז די היטץ איז גאָר גרויס, דהיינו בײַ אַ טיפּוס אָדער בײַ
אַ געהירען-אַנצונדונג, דארף מען צו לעהגען אַ בלאָז מיט אײַז .

אקפּוועהטאָג. אויב די קאָפּ-וועהטאָג איז פֿון אַ פֿערקיהלטען קאַטאַר,
איז גוט צו צולעהגען היטצע קאָמפרעסען .

קאפּוועהטאָג. אויב די קאָפּ-וועהטאָג איז פֿון אַ בלוט-שלאַג, דארף
מען שטעלען פּיאַווקעס אונטער די אויערען, דורך
אנערלויבענטש פֿון אַ דאָקטאָר, אויך איז גוט בײַ דעם פֿאַל צו מאַכען
דעם קראַנטען פֿױם-בעדען בײַ אונטער די קניה פֿון היטץ וואַסער מיט
אַש, אױב באָד דארף דויערען בערך אַ האַלבן שעה .

קאפּוועהטאָג. אויב די קאָפּ-וועהטאָג איז איבער אַ גערווען-שוועכונג,
איז גוט די אַפּטיק-רפּואה, צו קײַפֿען אין אַפּטיק
4 לױט קאַלי בראָמאַט *Kali bromati* 2 לױט קאַלי יאָדאַט *Kali jodati* .
און צו נעמען אנדערע האַלבן גלעזער קאָכענדיג וואַסער אַרײַנצוגיסען
אין אַרײַן פֿלעשעל. אין דעם פֿלעשעל זאָל מען אַרײַן טוהן 2 עס-לעפֿעל
קאַלי בראָמאַט און אײַן עס-לעפֿעל קאַלי יאָדאַט, דאָס זאָל צוגען גוט .
פֿון דעם זאָל דער קראַנטער טרינקען אַלע טאָג 3 עס-לעפֿעל .

קאפוועהמאג. אויב די קאפ-וועהמאג איז פון א קלאפ, דארף מען צולעהנען קאלטע קאמפרעסען פון וואסער מיט עסיג, אדער פון „ארניק“ *Flor. arnieae*, וועלכעס מען בעקומט צו קויפֿען אין אפטיק. דאס פֿעבריהט מען אזוי ווי טי. דעם סעניג לאזט מען אָב-קיהלען, און פֿון דעם לעהגט מען צו קאלטע קאמפרעסען.

קאפוועהמאג. אויב די קאפ-וועהמאג איז פון א מיגרענא, דארף מען ויך ווענדען צו א דאקטאר. א הויזליכע רפואה קאן זיין נאך אגאויסענווייניגסטע, מען ואל קויפֿען אין אפטיק גארטש-צאוו-שפּירט *Spirit sinapis*. פֿאר 20 קאפ און קאמפֿאר-שפּירט *Spirit Camphor*. פֿאר 10 קאפ און מען ואל אויסמישען צו וואסען צוויי חלקים פֿון גארטשניצאוו-שפּירט מיט איין חלק קאמפֿאר שפּירט. מיט דעם ואל מען איינרייבען דעם קאפ עטליכע מאל אין טאג.

קאפוועהמאג. נאך הויזליכע רפואה קאן זיין צו א מיגרענא, בשעת ווען די שמערצען האפען אן, ואל מען נעמען טרינקען אגראו הייסע שווארצע קאווע, אריינגעלעהגט א שטיקעל ציטריין אין די קאוו, דאס שטילט גוט דעם קאפ-וועהמאג.

קאפוועהמאג. טייל דאקטוירים רעקאמאנדירען צו א מיגרענא. אז דער מענש וואס ליידעט אויף דעם שטענדיג, ואל גיין אָנגעטוהן אויף די בלויע פֿאָדעשוויס א לאנג שטיקעל פלאסטינקא פֿון ריין שטאָהל. די פלאסטינקא קאן מען לאָזען מאַכען פֿון אַ וועג. די לענג פֿון די פלאסטינקא ואל זיין איבער די גאנצע פֿאָדעשוויס. די ברויט ואל זיין בערך אנדערהאלבען צאל. בשעת די פלאסטינקא איז צו געבינדען צו די פֿיס, קאן מען נישט האַבען קיין מיגרענא-שמערצען.

קרופֿ. דאס איז ועדר א געפֿעהרליכע קראנקהייט, וועלכעס טשעפעט ויך צו אממיינסטענס ביי קליינע קינדער. דאס איז די אספּרה. די נעסט פֿון די קראנקהייט איז אין די קעהל פֿון האַלדז, וואס זי ווערט אינוועהניג פֿערוואקסען און פֿערשטאָפט, אז דאס קינד קאן נישט אטעמען. ביי דער קראנקהייט מוז מען ויך באַדן ווענדען צו אַנומען דאקטער, מען ואל מאַכען דעם קינד איינשפּריצונג פֿון אַויז וערום, וועלכער איז ספעציעל צו דעם. און אויב דאס העלפט אויף נישט, מוז

מען זיך ווענדען צו אראקטער א חירורג, ער וואל מאכען דעם קינד
א אפעראציע .

קרופ. באלד אין אנהייב אזוי ווי מען הערט נאך אז דאס קינד הייבט
אהן מיט צו היסען, אזוי ווי פון א היל פאס, דארף מען
באלד, אירער מען קריגט דעם דאקטער, איינצונעמען דעם קינד פון
איינס ביו דריי לעפעלעך, בראך-וויין עס וואר אנברעכען. דאס ברעכען
צוריסט על פי רוב די קראנקהייט. נאכ'ן ברעכען דארף מען איינגעבען
דעם קינד עטליכע לעפעלעך, רציף-עהל אבצופוהרען. אויפ'ן העלדועל
דארף מען באלד צו לעגען קאלטע קאמפרעסען פון וואלף-וואסער, מען
וואל דאס מיט גוט אויסדרוקען, און פון אויבען צו פערבאנדאזשורען מיט
וואס. אויב עס איז דא אין שטוב בראנפען-שפריט, וואל מען מאכען
קאמפרעסען פון שפריט מיט וואסער, גלייך אויף גלייך.

קרעמפען. אדער קאנוואולסיע אדער ספאזמעס אדער אפאפלקעזיע
דאס איז אלץ עהנליכע קראנקהייטען, וועלכעס יעדער
קראנקהייט פון זי ווערט ארויסגעבראכט דורך א אנדערע אורזאכע. און
אזוי ווי די אלע קראנקהייטען זענען אלץ געפערליכע, מוז מען זיך
באלד ווענדען צו אראקטער, וועלכער וועט דערקאנען לויט בעשטימטע
סימנים וואס די אורזאכע פון דער קראנקהייט איז, דאן וועט ער שוין
וויסען וואס פאר א רפואות צו געבען.

קרעמפען. ביי קליינע קינדער ווערען די קרעמפען ארויסגעבראכט
אמאהל דורך דעם וואס די צינדלעך קומען שווער ארויס,
און אמאהל איז די אורזאכע א שווערע קראנקהייט, דהיינו לינגען-
אנצינדונג, נירען-קראנקהייט, שקארלאטיניעס, געהירען-אנצינדונג א. ו. ו.
ביו מען בעקומט אראקטער, דארף מען צולעהנען צום קעפעל קאלטע
קאמפרעסען פון וואסער מיט עסיג, צום ביכעל און צו די פיסלעך וואל
מען צו לעהנען הייסע קאמפרעסען. עס איז אויך ערלייבט צו מאכען
דעם קינד קירוסטירען פון וואלעריאן *radix Valerian*. מיט טייוילסקוים
Gummi resina Asa foetida. מען פערברייט א ביסעל וואלעריאן אין
א קווארטירעל קאכענדיג וואסער. צו דעם וואל מען אריינמישען א
לעפעלעך געשטויסענעם טייוילסקוים, מען מיסט אויס עס וואל גוט צוגעקן.

נאכהער זיט מען עס איבער דורך א טיכל. מען לאזט עס אויסקיחלען
עס זאך נאך זיין א ביסל ווארעם, מיט דעם זאל מען מאכען דעם קינד
א קריסטיר. נישט מיט דעם גאנצען קוואטירעל, נאר מיט א העלפט
אויף איינמאהל איז אויך גענוג.

קרעמפען. ביי עלטערע מענשען אדער ביי א קונדעסורען קאן מען
מאכען דעם קריסטיר אויף צוויי אופן. מען זאל פֿעבריהען
אביסל וואלעריאן אין א קוואטירעל קאכענדיג וואסער. און מען זאל
נעמען א עס-לעפל געשטויסענעם טייוולסקויט און אויסמישען גוט מיט
א געלעכץ פֿון א פֿריש הינערען איד, דעם סענץ פֿון וואלעריאן זאל מען
איבערווען און מען זאל צו זאמען מישען אלע 3 מינים. און מיט דעם
אין גאנצען קאן מען מאכען א קריסטיר, ווען עס ווערט אביסל
אָבגעקיהלט.

קשיו. צו קשיו-וועהטאָג, אפטיק-רפואה, צו קיפֿען אין אפטיק א
פֿלעשילע אויסלעגנדישען „עקספֿעללא“ Expella. און מיט דעם
צו שמירען דעם קשיו עטליכע מאָהל אין טאָג.

קשיו. צו קשיו-וועהטאָג, אפטיק-רפואה, צו קיפֿען אין אפטיק
„האַלץ-שפּריט“ מיט מערפֿאָנטין. אויס צומישען גלייך אויף
גלייך, און מיט דעם צו שמירען דעם קשיו עטליכע מאָהל אין טאָג.

קשיו. צו קשיו-וועהטאָג, הויזליכע רפואה, צו ווינקען מערקישען
פֿעפֿער אין שפּריט, און מיט דעם אויס צו שמירען דעם קשיו
צוויי מאָהל טעגליך.

קשיו. צו קשיו-וועהטאָג, אפטיק-רפואה, צו קיפֿען אין אפטיק
„נאַרטשיצאָווי-שפּריט“ און אויף „קאמפֿאר-שפּריט“. אויס צומישען
צוויי חלקים „נאַרטשיצאָווי-שפּריט“ מיט איין חלק „קאמפֿאר-שפּריט“. און
מיט דעם צו שמירען דעם קשיו עטליכע מאָהל אין טאָג.

קשיו. צו קשיו-וועהטאָג, הויזליכע רפואה צו לעהגען זיך אין בעט
אריין, און אונטער צו לעהגען אונטערן קשיו א זעקעלע מיט
היס וואס, אדער א פֿלאטשיקע בלעכענע באניע מיט הייס וואסער.

קשיו. צו קשיו-וועהטאָג, הויזליכע רפואה, צו מאכען דעם קראנקען
ביי נאכט א הייסע באָד פֿון זאלץ, בערך פֿון 6 ביז 8 פֿונד.

דער קראנקער וואָל זיצען אין די באָד בערך אַ האַלבן שעה . דאָס
וואַסער מען האַלטען בערך 30 גראַד היץ . אַוועלכע בעדער וואָל מען
מען איהם מאַכען אלע צוויי טאָג .



(7)

רײַז . דאָס איז אַנעשווילעכץ פֿון וועלכען דער מענטש ליידעט גרויסע
שמערצען . מען רופט עס „רײַז“ צוליב דעם ווייל דאָס נע-
שווילעכץ איז רײַז און גלענצענדיג , אזוי ווי דער קאלער פֿון אַ בלוטען-
רײַז . עס איז פֿערהאָן 3 מינים אין דער קראַנקהײַט : (1) אַ נעוועהגליכער
רײַז , וועלכער איז גלאַטיג אָן אַ שום קרעצעל , און שטעהט אויף אײַן
אַרט , (2) אַ רײַז וואָס שפּרינגט פֿון אײַן אָרט צום צווייטען אָרט , און
אמאָהל נאָך אויף אַנדערע ערטער פֿון דעם קערפּער , (3) אַ רײַז וואָס
האָט עטליכע קרעצליכע אָדער בלעזעלעך קליינע דערפֿארט מיט אײַם
וואַסער , וועלכעס ענטהאַלט דעם גיפֿט פֿון דעם רײַז . די רײַז-קראַנקהײַט
איז אויך פֿאַרעכענט צווישען די אַנשטעקענדיגע קראַנקהײַטען . אַממײַנס-
מענס איז די קראַנקהײַט גוט קיין נעפֿעהרליכע . אָבער קײַם פֿערקריכט
דער רײַז אויף דעם אויבערשטען חלק פֿון קאָפּ , דאָן איז שוין די קראַנק-
הײַט ווער געפֿעהרליך , דעסמגליכען ביז די גינעבוידענע קינדער , אויב
עס האָט זיך ביז זי געמאַכט אַרײַם אַרום דעם נאָפֿער , איז עס אויך
ווער שטאַרק געפֿעהרליך , און מען מוז זיך באַלד איז אַוועלכע פֿאַרען
ווענדען צו אַ דאָקטאָר .

ר״ז. אפטיק-מיטלען איז פֿערהאן גענוג אויסצוהעלען טרױו, אָבער
בעױל די קראַנקהײט איז גיט בײַ אַלע מענשען גלײַך, קאָנען די
אפטיק-מיטלען אויך נישט זײַן בײַ אַלע מענשען גלײַך, אַזױ מוז מען
זיך ווענדען בײַ דער קראַנקהײט צו אַ גוטען ספּעציעלען הױט-דאָקטאָר.
ר״ז. פֿון די הױזליכע מיטלען איז דאָ פֿיעל מעהר וואָס מאַכען ערגער
אידער בעסער. דאָס פֿערשפּרעכען וואָס מען לאָזט פֿערשפּרעכען
א רױו הערפּט יאָ אין פֿיעל פֿאַלען. און איבערהויפּט איז עס דאָס אַ מיטעל
וועלכעס קאָן נישט קאַלן מאַכען. אויב דער רױו איז נישט זעהר מיט אַ
שאַרפען חאַראַקטער, און קײַן דאָקטאָר איז אויף נישט אַזױ לײַכט צו
בעקומען, דאן קאָן מען זיך פֿערלאָזען אויף דעם הױזליכען מיטעל. מען
זאָל צושטויסען קרייד דין ווי מעהל, און מען זאָל מיט דעם קרייד-
פּולווער בעשימען דעם רױו. פֿון אויבען זאָל מען אַרױפֿלעהגען אַרױס
שטויקעל פֿלאַנעל, אָדער אַ אנדער שטויקעל וואָל-שטאָף מיט אַרױמע
קאָליר, און אַזױ זאָל מען דעם רױו פֿערבאַנדענשירען אויף עטליכע
טאָג. בײַ דער קראַנקער שפּירט שוין נישט קײַן שמערצען.
ר״ז. מען דאַרף זײַן שטאַרק געהוטען מען זאָל קײַן רױו נישט פֿאַר-
געצען מיט קאַלט וואַסער. אויב דער רױו איז געוואָרען פֿאַרניצט,
און דאָס אָנצונדונג מיט די שמערצען האָבען זיך געשטאַרקט, דאַרף
מען באַלד צוועהגען קאָמפּרעסען פֿון שפּירט.

רעגאַל. עס איז פֿערהאן פֿרױען וואָס הערען אויף צו פֿיהרען סדר נשים
נאָך גאָר אין דער יונגענד. דאָס קאָן ברענגען צו אַ קראַנקהײט.
דעסטונדעם איז פֿערהאן מעדלעך, וועלכע קאָנען נישט קריגען אַזױ
גוך דעם רעגאַל, דאָס איז אויך אַ קראַנקהײט.
רעגאַל. צו דערוועקען דעם רעגאַל. אפטיק-רפּואַה, צו קױפֿען אין
אפטיק דאָס קרימעכץ „סאַבינאַ“ Sabina. אין דאָס צו פֿער-
ברױען אַזױ ווי סײַ, און צו טרינקען מיט צוקער אַלע טאָג. אויך איז גוט
לױט דאָקטערײַ, זי וואָל זיך מאַכען הייסע בעדער, און מען זאָל אַרױס-
טוהן אין דעם קאָלדענדיגען וואַסער אַ האַלב קוואַרטל „גאַרמשינאַ“,
רעגאַל. צו דערוועקען דעם רעגאַל. הױזליכע רפּואַה, אָנצוקאָכען
אַ טאָפּ וואַסער פֿון 4 קוואַרט. בשעת דעם קאָכען זאָל מען
אַרײַנשוהן 2 לױט צימרינד, אײַן לױט בשם-געגלעך, אַ האַלב לױט

ואפערען. דאס וואל מען לאזען אבציהען. נאכהער וואל מען דאס אדורכ-
זיען דורך ארען טיף אין ארען גוסען אין 4 פלעשער מען וואל גוט
פערקארקעווען. פון דעם וואסער וואל זי אלע טאג טרינקען. עטליכע
גלעזער, אדער קאלט אדער הייס.

רעוומאטיזם. אפטמאל רפואה, צו קויפען אין אפטמאל טערפאנטין מיט
האלץ-שפירט, די בידע אויסצומישען, האלב אויף
האלב, און מיט דעם צו שמיצען ווי די וועהסטאג איז, עטליכע
מאהל טעגליך.

רעוומאטיזם. הייזליכע רפואה, איינצונומען געריבענעם חרען אין
א פלעשעל מיט אקעוועט שפירט, אין דעם וואל מען
אריינמוהן עטליכע לעפער וואלץ. דאס וואל זיך אזוי וויקען 3 טאג.
נאכהער קאן מען שוין שמיצען מיט דעם שפירט ווי די וועהסטאג איז,
עטליכע מאהל טעגליך.

רעוומאטיזם. הייזליכע רפואה, איינצונומען קליינע שטיקעלעך
אומגעלאשענעם קאלף אין אקעוועט שפירט, דאס וואל
זיך אזוי וויקען 3 טאג אויף א ווארעם ארט. נאכהער וואל מען אלע
מאהל אבזיען א בוסעל שפירט און מיט דעם צו שמיצען ווי די וועהסטאג
איז, עטליכע מאל טעגליך.

רעוומאטיזם. הייזליכע רפואה, איינצונומען בערך 200 גארלען.
ריינע גישט קיין פערדיואועטע, אין א קוואטירעל גוטען
שטארקען עסיג. אז דאס וועט זיך אזוי וויקען בערך פון איין חודש ביז
צוויי חדשים, וועלען די גארלען צו געהן אין עסיג, אזוי אז מען וועט
זי גאר גישט אנועהן. מיט דעם עסיג וואל מען שמיצען ווי די וועהסטאג
איז, עטליכע מאהל טעגליך.

רעוומאטיזם. פיעל מאהל העלפט צו רימאטען ווארעמע בעדער פון
צוויי דריטעל וואלץ און איין דריטעל וועט-סאדע, די
ווארעמקייט פון דער וואנע וואל זיין פון 28 ביז 30 גראד היץ. דער
קראנקער דארף ווערן און דער וואנע ביז א האלבע שעה. אויב דער
קראנקער איז צו שוואך צו פארנעמען ווארעמע בעדער, מאכען נאך די
בעדער ערגער, אלוא איז גלייכער ווערען בעדער מאכען צו ווערען
זיך צו א דאקטאר.

עוואלמיזם. די קראנקע וואס ליידען אויף רומאטען, מאַרען נישט
עסען קיין פֿעט פֿלייש, נאָר נאָר וועהניג וויס היגעריען
פֿלייש, פֿאַר דאָס וואָלען זיך עסען פֿיער פֿרוכטען און יארזונא. פֿון
מאָדעראַטער גענענד ווענען די בעסטע וואַרעם-בערער צו דעם קראַנק-
הייט: בוסק און ציעחאָצינקע.



(ז)

גרווערע-קרענק. די קראַנקע וואָס ליידען אויף די שווערע-קרענק
וואָלען זיך הימלען פֿון די פֿאַלגענדע וואָלען:

אָפֿענענען זיך פֿון בעס.

נישט אָנצוקוקען דאָס פנים פֿון אַ טיירטען מענטש, און אַפֿילו נאָך
דער לויט אויף נישט נאָך צו געהן.

נישט צו הערען ווי אַ מוילק שפּיעלט. און נישט צו זיין אין אַ סתירה
בשעת ווען די מיהל מאַהלט.

נישט צו זיין ביי קיין בעקער אין דער בעקעריי, ווען דער אייבען באַקט.

נישט צו געהן אין קיין באַד אַרײַן, נישט אין קיין סקוה אַרײַן, נאָר

ער וואָל זיך מאַכען וואַרעמע וואַנעס, און אָנזאָשען זיך מיט קאלט
וואַסער.

ער וואָל נישט עסען נישט קיין הייס ברויט, נישט קיין שוואַרץ ברויט,

בויט קיין ריגום-פֿלייש און נישט קיין דארען קעז.

ער וואָל נישט עסען קיין שום קאָפֿען-פֿלייש, אַפֿילו אַ קעסעל פֿון אַ פֿריש-

אײַך נישט.

(8) ער וואָל נישט טרונקען קיין שום משקה, ווערבע ענטהאלט אין זיך אלכאהאָל. עסטוי, קאווי אונט וואָל ער אויך נישט טרונקען.

(9) ער וואָל זעהן צו האָבען אלע מאָג שטיל-גאָנג, אויב ער קאָן נישט פֿון ייִך וואָלסט, וואָל ער איינגעמען עפעס פֿון די נרוגע מיטלען.

(10) אלע ערב ראש חודש וואָל ער איינגעמען ווערן-קרויט, וועלכעס מען קריגט צו קויפֿען אין אפטיק.

(11) פֿאסטען טאָר נישט אױ קראנקער, נאָר ער וואָל זעהן אלע מאָג באַלד אין דער פֿריה צו עסען.

(12) פֿון פֿעבראַצען פֿרויען-געשעכט, וואָל ער זעהן ווי ווייט מעגליך איז איינצוהאלטען זיך, און נאָר וועגן צו בענוצען.

שווערע-קרענק.

נישט בחנם רופֿט עס זיך שווערע-קרענק. די קראנקהייט איז זעהר שווער אויס צו היילען. ביז

היינט האָבען נאָך אלץ די דאָקטוירים קיין זיכערע ספעציעלע רפואה צו דער קראנקהייט נישט געפֿונען. אויסער דעם איז די קראנקהייט זעהר

אשווערע וואָ קענען די מענשען וואָס געפֿונען זיך ארום דעם קראנקען בעווייזן עס פֿאלט אויף אלע אַ שרעק פֿון דעם קראנקען, דורך זיין

פֿרוצלינגען אנדערפֿאלען מיט אווילד אויסגעשרי, מיט שרעקליכע פֿאזמעס און קרעמפען.

שווערע קרענק.

אפטיק-רפואה, צו קויפֿען אין אפטיק, קאלי-בראָמאטי *Kali bromati*. און אויך, קאלי-יאָדאטי *Kali jodati*.

און מען וואָל נעמען אנדערע אלבען גליוער הייס וואסער געקאכטעס. אריינגיסען אין אריין פֿלעשעל און מען וואָל אריין טאָהן אין דעם פֿלעשעל

2 עס-לעפֿעל קאלי-בראָמאטן מיט איין עס-לעפֿעל קאלי-יאָדאטי. דאָס וואָל צוגעהן אין וואסער. און פֿון דעם וואָל דער קראנקער טרונקען 3 עס-לעפֿעל

מעגליך.

שווערע-קרענק.

אפטיק-רפואה, צו קויפֿען אין אפטיק דאָס קרייטעכץ, הערבע-רוטא *herba Ruta*. מיט, וואסער-אין-קאָרדען *radix Valerian*. דאָס וואָל מען פֿעבריהען פֿון בילדע מינים אלע מאָהל צו

בוטלעך אױ ווי טי, און דער קראנקער וואָל פֿון דעם טרונקען 3 גליוער אלע טאָג מיט צוקער.

שווערע-קרענק.

די קראנקע וואָס דער נאפֿאר האפט זיך נישט אָן פֿרוצלינג, נאָר זיך שפּירען דערפֿויער אז עס הייבט

זיך אָן נישט גוט צו ווערען, און אז עס הייבט זיך אָן צוהען ביי

אדאנד אדער ביי א פוס, ווי קאנען זיך פערמיטלען פון דעם צופאל דער-
מיט, וואס זיי זאלען באלד האפען אין טויל אריין א פול קאווי-לעפעלע.
זאלן, און זאלען פערמינקען א ביסעל קאלט וואסער.

שווינדזוכט. דאס איז זעהר אנגעפערליכע לינגען-קראנקהייט. די
קראנקהייט ווערט גערעכענט צווישען די ערשטע קלאס
פון די אנשטעקענדיגע קראנקהייטען. דאס געהט באד איבער פון מאן
צום ווייב. פון ווייב צו דעם מאן. אייך איז דאס א ירושה-קראנקהייט,
וועלכע געהט איבער פון די עלטערען צו זייערע קינדער. פון די קראנק-
הייט קאן מען זיך אנשטעקען דורך די לופט אייך. בעווייל די באקצילען
פון דער קראנקהייט, ווערען זענען געפונען געווארען דורך דעם גרויסען
דאקטאר Koch, געפונען זיך זעהר פועל אין דער לחות פון קראנקען.
און אזוי ווי די לופט האט במבע ליעב אריין צו ואפען אין זיך אלע
פייכטיגקייטען, ווערט דורך דעם די לופט פאראומרייניגט מיט די באקצילען
פון דער קראנקהייט, וועלכע האלטען זיך נאנט גוט אין דער לופט מיט
זייער גאנצער קראפט. אלזא דארף יעדער מענטש וויסען צו זיין שטארק
פארויכטיג ביי אזוי קראנקען.

שווינדזוכט. צו דער קראנקהייט האבען נאך די דאקטוירים קיין זיכערע
ספעציעלע רפואה נישט געפונען. די ערשטע רפואה צום
דעם בעשטעמט נאך פון גוטע פרישע לופט, אז דער קראנקער זאל
אימער ווערן אין וואלד פון סאסנע בוימער. די גוטע פרישע לופט, וואס
דער קראנקער אטהעמט אין די לונגען אריין, היילט אויס די לונגען,
דורך דעם וואס זיי פארניכטעט די באקצילען, פון דער קראנקהייט, בעווייל
גוטע פרישע לופט מיט די באקצילען, זענען אזוי ווי פייער מיט וואסער.
שווינדזוכט. די צווייטע הויפט-רפואה צו דער קראנקהייט איז, אז דער
קראנקער זאל עסען און טרינקען זעהר גוט, און אטמאנעס-
פענס זאל ער אין זיך אריינגעמען פועל פעסטיגקייטען, דהיינו קעפער,
קומיס, מילך מיט בוטער, פיש-טראהן, הונדס-שמאלץ, און אויך גענוען-
שמאלץ מיט מילך. די קראנקע פון ארעמט קלאס, אויב דער מאגען איז
נאך ביי זיי געזונד, דארפען זיי עסען אלע מאג האמט פיסען-פלייש מיט
די פעטע זאצן פון די פיש, אויב ער קאן נישט פארנעמען קיין דונדערנע
פיש, זאך מען איהם קאכען קעלבערנע פיסלעך.

שווינדזוכט. דער ארימער פראסטער נארד, וועלכע וואהנען אין דערפער, האלטען זיך ביי די רפואה. אזוי ווי עס ווערט עמעצער פון זי קראנק אויף שווינדזוכט, ריכטען זיי אויס פאקשוועס (קראפיווא) מיט די ווארצלען. די בלעטלעך טריקענען זיי אויס און מאכען דערפון ציגארעטקס צום ריכערען, און די ווארצלען טריקענען זיי אויך אויס, דערנאך פאבריהען זיי די ווארצלען זא ווי מעה, און דער קראנקער טרינקט פון דעם עטליכע גלעזער טעגליך.

שווייס. דער וואס האט זיך צוגעקיהלט אבוסעל און האט געקריגען אהוסט, זאל ער ערשטענס זעהן צו שוויצען. ברענגען שווייס קאן מען דורך די רפואה. צו קויפען אין אפטיק בעזאוו-טע מיט ליפאוו-טעה יעדערס פאר 3 קאפ, און אויך גיטריקענטע מאלעס פאר 5 קאפ, מען זאל אנקאכען א קווארט וואסער, און מען זאל אריין מוהן אין קאכען-דיגען וואסער די 3 מינים, נאכהער זאל מען דעם טאפ אוועקנעמען פון פֿייער, צו דעקען מיט א שטערץ, עס זאל זיך אבציהען גוט. אין די 4 גלעזער זאל ער אויסטרינקען מיט צוקער און מיט ציטרוין היסערהייט ליגענדיג אין בעט, וועט ער שוויצען.

שווייס. די מענשען וואס האבען א טבע שטארק צו שוויצען ביי נאכט, דאס נעמט ארויס דעם בח פון מענש. א רפואה דער צו איז צו קויפען פֿיש-טראן. און זאל קויפען אין אפטיק געגעלעך-עהל, עס רופט זיך „נעלקין-עהל“ Oli Nelkin און מען זאל אריינמוהן אין איין קווארטירעל פֿיש-טראהן 15 קראפלעס נעלקין-עהל. דעם פֿיש-טראהן מיט דעם נעלקין-עהל דארף מען צו דערווארעמען וועט עס זיך גוט אויסמישען. דעסם גלייכען פאר יעדען כאהל שמירען דארף מען אלץ דעם פֿיש-טראהן צו דערווארעמען. דאס שמירען זאל זיין בינאכט פארען שלאפען געהן דעם גאנצען קערפער. נאכען שמירען זאל ער זיך אנטוהן אויף בינאכט א אנדער העמד, און אלע אין דערפריה זאל ער דאס העמד איבערטיישען.

שווייס. גענען פֿיש-שווייס. א הויזליכע רפואה. מען זאל די פֿיש אלע נאכט גוט אויסוויקען אין קאלט וואסער מיט עססיג, און אלע אין דער פריה זאל ער אריינשיטען אין די זאקען אריין געמאלענעם בור-זויערץ פראשעק, וועלכעס מען בעקומט צו קויפען אין אפטיק, עס קוקט אויס אזוי ווי מעה, אויף ליטוין היסט עס: Pulv. acidi brieri.

שמיין. די שטין-קראנקהיט איז פערהטן צווייטערלעך שמינער: (1) גאל-שמינער, וועלכע ווערען בעשאפען פון דעם פליסיגקייט וואס עס געפינט זיך אין דער גאל, איבער א אומבעוואוסטע אורזאכע. דער ראנקער קריגט אפטער שרעקליכע גאפארען מיט גרויסע שטערצען אין דער רעכטער זייט. און אפטמאל מוז דער קראנקער ברעכען.

(2) הארנבלאזע-שמינער, וועלכע ווערען בעשאפען אין די נירען און רוקען זיך אריין אין די הארנבלאז, ווי זי וואקסען דארט און קאנען ווערען אזוי גרויס ווי א הינערען איי. דאס מאטריאל פון די הארנבלאזע-שמינער איז א וועלכע פליסעקייטען וואס געפינען זיך אין די אורין, און זי ווערען פערהארטוועט דעפויער אויף קליינע זאמללעך. די זאמללעך ווערען צו געקלעפט איינס צום צווייטען, פון וועלכען עס ווערט גרויסע שמינלעך, דאן קאן דער קראנקער נישט לאזען די אורין אזוי ווי עס דארף זיין. און אמאל ברענגט דאס ארויס אויך א נירען-אנצונדונג.

שמיין. אזוי ווי די ביידערלעך קראנקהייטען זענען געפערלליכע, און א גוטער געניטער דאקטאר איז בפה דאס אויס צו קירירען, אלזא איז דאס גלייכסטע צו ווענדען זיך צו א דאקטאר.

שמיין. דא ווי מען בעקומט נישט קיין דאקטאר, קאן מען זיך זעלבסט ערלויבען ביי גאל-שמינער פאלגענדע מיטלען:

- (1) איינצונעמען אלע מאג בערך 10 טראפען טערפאגאטין אויף מילך.
- (2) צו טרינקען אלע מאג גוטען בויעהל פון 6 ביז 12 לעפעל.
- (3) צו עסען פיעל ציטרינען.
- (4) צו קיפען אין אפטטיק דאס קרייטעכץ „הערבא פאליגאנום-א-אריקולארע“ *herba Polygonum auriculare*. דאס זאל מען פעבריהען אזוי ווי טי, און דער קראנקער זאל פון דעם טרינקען עטליכע גלעזער אדע מאג.

שמיין. ביי הארנבלאזע-שמינער. דא ווי עס איז נישט צו בעקומען קיין דאקטאר, קאן מען זיך זעלבסט ערלויבען פאלגענדע מיטלען.

- (1) נאך יעדען עסען זאל ער אייננעמען א קאווי-לעפעלע טרינק-סאדע און א דריטעל גלאז וואסער.

(2) מען זאל קאכען 2 עס-לעפעל קנאבער זאטמען מיט א קווארט וואסער, דאס זאל מען אבזיען, לאזען אבקהלען. פון דעם וואסער זאל דער קראנקער טרינקען עטליכע מאל אין מאג צו עס-לעפעל, און קליינע קינדער צו קאווי-לעפעלעך.

- (3) מען זאל קויפֿען אין אפֿטיק דאס קריטעכץ, פֿלאַדעם=ראַוואַנדול" Flores Lavanduli. דאָס זאל מען וויקען אין גומען ווײַן 24 שעה.
פֿון דעם ווײַן זאל דער קראַנקער טרינקען אלע 2 שעה אַ לעפֿעל.
(4) אייב דער קראַנקער קאָן נישט קיין אַרײַן לאָזען, זאל מען קאָכען פֿיעטרושקע מיט וואַסער, און דער קראַנקער זאל דאָס וואַסער טרינקען.
(5) מען זאל קויפֿען אין אפֿטיק דאָס קריטעכץ, "הערבא-עקוויוועטי" herba Equiseti. דאָס זאל מען פֿעברײַהען אַזױ זײַט, און געבען דעם קראַנקען צו טרינקען.
(6) האָבער-גריץ זאל מען איהם קאָכען צום עסען.
(7) מען זאל איהם מאַכען וואַרמע בעדער פֿון וואַסער וואָס עס איז געקאכט געוואָרען מיט האָבער, אָדער מיט האָבער-שטרוי, אָדער מיט דעם זעבען קריטעכץ, "הערבא-עקוויוועטי".
שטיין. די מענשען וואָס ליידען אײַף אַ שטיין-קראַנקהײַט מאַרען נישט עסען קיין פֿלייש. בעווײַז אין פֿריש געפֿונט זיך פֿועל שטיק-שטאָף, פֿון וועלכען עס ווערט אין קערפֿער אױסגעארבײַט די האַרנווערע, און פֿון די האַרנווערע ענטוויקלען זיך די שטיינער.

שלאף. בײַ וועמען דער שלאף איז אײַעקגענומען געוואָרען, און ער דארף זעהר אַנטשלאפֿענעם צו ווערען. הײַזליכע רפואה צו צו-לעהגען אײַפֿין קאָפּ אין דערמיט, אַ בײַטעל מיט פֿיכט זאלץ, אָד דאָס זאלץ ווערט בריקען אײַפֿין קאָפּ, זאָר מען עס מאַכען צוריק פֿיכט.

שליקערץ. אַממאָנסטענס ווערט דער שליקערץ אַרײַסגערופען דורך דעם וואָס דער מאַגען איז שוואַך צוליבע אַ קראַנקהײַט, און ווען דער מאַגען הײַבט אָהן ספּאַזמירען, הײַבט דער קראַנקער אָן צו שליקערצען. דער שליקערץ קאָן זיך אבער אײַך דערנעמען צו ליעב אַ האַרץ-קראַנקהײַט. אַ גומער גענימער דאָקטאָר קאָן וויסען לײַט בעשטימטע סימפּטאָמען, אײַף וועלכע קראַנקהײַט דער שליקערץ בעווײַזט.
שליקערץ. אין פֿועל פֿאלען קאָן דער שליקערץ בערוהנגס ווערען, אָד דער מענטש זאל זיך אַנדערזעצען און זאל נישט קיין רײַז טוהן מיט קיין שום אבר. אָד ער וועט אַזױ זיצען אַקלינגע טונגס וועט

דער שליקערץ באלד אויפהערען. אפטמאָהר ווערט אויף דער שליקערץ
בערהאנגט פון דעם, וואָס דער מענטש האפט באלד און טייל אַרײַן עפּעס
אָנעם-אָנק און שלונגט אַרױב.

שליקערץ. הויזליכע רפואה, צו טרינקען באלד אין דער פריה קאָזע-
מילך וואַרמע באלד פֿון דער מעלק.

שקראפער. דאָס איז אַ קראַנקהייט וואָס מען זעהט עס אַמטליכנסטענס
ביי קינדער פֿון די אַרעמע קלאַסען. קיין זיכערע
ספעציעלע רפואה האָבען נאָך די דאָקטוירים צו דער קראַנקהייט נישט
געפונען. דער עיקר הילונג בעשטעהט פון דעם. מען זאָל דאָס קינד
קרעפטיגען מיט וואָס נאָר מעגליך איז. ווינטער זאָל מען איהם געבען צו
טרינקען פיש-טראָהן. אויף איז גוט צו מאַכען דעם קינד זאָל-בערלעך.
מאָל-בערלעך. וויציגע קרייזן בערלעך. וויטער צייט איז גוט צו מאַכען
בערלעך, מען זאָל קאָכען בלעטער פון טערקישע נים-בוימער, אין דאָס
קינד זאָל מען באַדען אין דעם וואַסער.

שקראפער. האַטש די דאָקטוירים האָבען נאָך נישט געפונען קיין
זיכערע ספעציעלע רפואה, פון דעסוועגען דארף מען
זיך ווענדען ביי דער קראַנקהייט צו אַ דאָקטאָר. בעווייל עס געפֿינט זיך
אפטמאָל-מיטערען צו פֿערליכטען די קראַנקהייט. דהיינו יאָר, פֿאַכפֿאַר.
אויך קאָן דער דאָקטאָר אַ עצה געבען צו זאָל מען פֿאַהרען מיט דעם קינד
אין אַ וואַרעם-באָד צו נישט. פֿון וואַרשאַווער געגענד איז דאָס בעסטע
באָד צו דער קראַנקהייט „ציעחאָזיגעק“. אויב מען דערקאָנט אז דאָס
געשווינדעכץ פון שקראַפֿעל איז פֿון אונטען ווייך געוואָרען און עס איז
וויטער הויך, איז אַ סימן אז עס האָט דאָרט אָנגעצויגען מאַטעריע,
דאָן איז דאָס גלייכסטע דער דאָקטאָר זאָל דאָס אויף מאַכען.



ת"י . קאפּע . שאַקאלאַד .

אזוי ווי די וועלט האָט אָנגענומען פֿאַר אַ גוטען געמראַנק די 3 מינים, איז כדאי זיך אָבזושטעלען און גוט צו בעטראַכטען די מעלות מיט די פֿעהלערען וואָס זיי ברענגען צו דעם מענשענס געזונד. נאָר דערפֿור מוז מען געבען דעם לעזער אַ ערקלערונג, אום ער זאָל בעקאָנט ווערען מיט די פראָדוקטען וואָס אין זיי שטעקט, און פֿון וואַנען זיי ווערען דאָ צו אינו אַהער געבראַכט.

די קוועלע פֿון ת"י איז: חנא, יאפּאָן, אינדיען און אמעריקא. קיין אמעריקא האָט מען די ת"י אָנגעהויבען אַרזינברענגען, ערשט אים ענדע 16-טען יאָהר הונדערט.

די ת"י-בלעטלעך וואַקסען אויף נישט קיין הויכע בוימערעך פֿון 3 ביז 4 מאָהל אין יאָהר. די ת"י פֿון ערשטען שניט, דאָס הייסט די וועלכע ווערט אַראָבגענומען פֿון די בוימער אין חודש ניסן, די איז די בעסטע. די לעצטע אָבער, וועלכע ווערט אַראָבגענומען אין חודש אלול, די איז די געמינסטע.

די ת"י-בלעטלעך ווערען געוויקט אין וואַסער. נאָכדער ווערען זיי געטרוקענט און פֿערוויקעלט. און דאָן ערשט ווערען זיי פאַפראַוועט מיט געשמאַקטען, און מען פֿערפאַקט זיי אין זעקלעך. די זעקלעך ווערען אַרזינגעלט אין קאסטענס אַרין, און אזוי נאָך ווערען זיי אוועקגעשיקט און צו שפּרייט אויף דער גאנצער וועלט.

לויט די בעמישע אנאליזע בעשטעהט די ת"י פֿון 7 שטאָלען:

(1) פּאָפּעאָן אָדער טהעאָין. (2) עטהער עהל. (3) וואַקס. (4) זייוועצע. (5) גערבשטאָף. (6) גרינשטאָף. (7) אַיי-ווייס. אויף דעם מעגליכען אָרגאניזם איז דאָס די ווירקונג פֿון די ת"י: אז מען טרינקט נישט צו פֿיעל מאַכט עס אַ קליינע איפֿרעגונג אויף די גערווען, און עס שטעהרט נישט דעם מאַגען צו פֿערדייען דאָס עסען. אָבער אז מען טרינקט די ת"י צופֿירע, מאַכט עס אַרייַמזן אויף די גערווען אזוי ווי אלכאָהאָל. און דורך דעם גערבשטאָף ווערט דער מאַגען געשמערט אין זיין אַרבייט.

עס ווערט אויסגעערעכענט לויט בעמישע אנאליזע, אז אין 10 גלעזער געזינעהליכע ת"י, קאָן זיך געפֿונען אַ 1/4 גראַם פֿון דעם שטאַר-קען שטאַף תהעאָין. און אז אַ מענש זאָל אין זיך אַרזינגעמען אַביסעל מעהר פֿון דעם שטאַרקען שטאַף, קאָן ער בעקומען האַרץ קלאַפּונג, און עס ווערט ביי איהם אוועקגענומען דער שלאָף. אַלזאָ בעדאַרף מען זיין געוואָרענט, נישט צו טרינקען מעהר ווי 10 גלעזער ת"י אין מעת לעת: אויף בעדאַרף מען זיין שטאַרק אויפֿריכטיג וועגען די פֿאַלספֿיקאציע.

פֿון די תי. וואָרען נישט גענוג וואס דער חנינער מיט דעם לאנגען
צאפ מאכט מיט די תי וואס ער וויל. דהיינו ער מישט אריין בלעטלעך
פֿון די ביימלעך וואס מיר אירען נישטען פֿאר הישענות. געפונען זיך
ווייטער דא אין אמרופא גרויסע „חכמים“ וואס אז מיר בעקומען שוין די
סחורה דא, ארבייטען זי ערשט איבער די תי, און מישען אריין א גרויסע
מפה פֿון ערוב, אזוי אז די אמת'ע תי ווערט און יעדען פעקעלע בטל
בשמים און אנדערע פסולה. טהייר פון די „חכמים“ קויפֿען גאָר אויפֿ-
געקאכטע תי, טרוקענען און פֿארבען און פֿערפֿאקען זי אין שעהנע
פעקעלעך, און פֿערקויפֿען דאס פֿאר תי. דאס אלעס פֿאקט מען נאָר
אויפֿן און דעם אַרומטאן. וואָרען דער נגיד איז דאָ אַ מבין, און עס איז
איהם שווער צו גענאָרען.

אויף דאָרף מען צו בעמערקען, אז וואס וועניגער די תי ציהט זיך
אָב אין שטיינקעל, איז דער מענץ געוונדער צום טרונקען.
נאָך איז פֿראַי צו מאכען דעם לעזער אויפֿמערקזאם, ווי אזוי צו
טרונקען די תי. פֿיעל מענשען האָבען ליעב צו טרונקען די תי קאָבע-
דיג, אזוי אז די טעמפֿעראטור פֿון דעם גלאָז תי קאָן שטייגען ביז
50 גראַד הימץ.

אָבער דאס איז א גרויסער פֿעהלער צום מאָגען, דאס ברענגט צום
מאָגען די קראנקהייט kardialgi, פֿון וועלכען דער מאָגען ווערט צו
פֿיעל צווייגען, און דער מענטש ברעכט אָב צוריק דאס עסען. אַלואַ
בעדאָרף מען געדאנקען נישט צו טרונקען קיין קאָבענדיגע תי, נאָר
אזוי אז זי זאָל מער נישט ענטהאַרטען ווי פֿון 40 ביז 50 גראַד הימץ.
נאָך תי ווערט עטוואָס וועהניגער פֿערברויכט אין געטראַנק קאָפֿע,
די קאָפֿע-קערענדלעך וואס מען אויף בוימלעך, אזוי ווי עס וואס מען ביי
אונז קערשען. די קוועללע פֿון קאָפֿע איז אביסניא, און נאָך אנדערע
ערטער און אויף, אפֿריקא און אמעריקא. אין קאָפֿע-קערענדלעך איז
דא צוויי ערליי מינים געשפֿאַלטענע, און אומגעשפֿאַלטענע, וועלכע רופֿט
זיך פֿעריק-קאווע, קיין אונטערשייד צווישען די בייזערליי מינים איז
נישט פֿערהאנגען. בייזע מינים האָבען איין אייגענשאַפֿט. אין בייזע מינים
געפונען זיך גלייך דער שמאץ באַפֿעאין, וועלכעס אויב דער מענטש
פֿערברויכט צו פֿיעל, קאָן עס זיין שעדליך צו די נערווען און צום האַרץ.
די סימנים פֿון די גוטע קאָפֿע זענען פֿאלגענדע: די קערענדלעך
דארפֿען זיין גאָנץ, עס זאָל זיך נישט געפונען צווישען זי קיין שטיקלעך.
די קערענדלעך דארפֿען זיין צווייפֿגעשטעלט פֿון א שטאַהל מיט אַיאָרע
אינוועהניג. די קערענדלעך, אז מען לעגט זי אריין אין וואַסער,
בעדארפֿען זי אראָב צו פֿאלען, נישט אַרום צו שווימען פֿון אויפֿען.
אומגעברענטע קאָפֿע האָט נישט דאס זעלבע אייגענשאַפֿט, עס זאָל
אזוי גוט ווירקען אויף די נערווען ווי געברענטע. אַמגלייכסטען איז צו

קויפֿען גאנצע קאפֿע, נישט קיין געמאלענע. וואָרען אין די געמאלענע
אין אַרײַנגעמישט פֿיעל פֿסילת.

קאפֿע דארף מען נישט קאכען אין אַ מאָס אויפֿגעדעקט. וואָרען
מיט דער פֿארע געהט אַרויס דער גאנצער קראפט. דער בעסטער
פֿארמקל איז, אז מען וואָל די קאפֿע גוט צו שטויסען, אַרײַן טהון אין
אַ בליי און אַרײַפֿונגען קאכענדיג וואַסער. גאָהער וואָל מען די בליי
באָדער גוט צו דעקען, עס וואָל יוד גוט אַבזעהען, און דאָס וואָל מען
טרונקען אָדער ריין, אָדער צו געמישט אַ ביסלעל סילד מיט אַ געלעכץ
פֿון אַ אײ.

קאפֿע איז אויך נישט געוונד צו טרונקען צו פֿועל, פֿון צו פֿיעל
קאפֿע טרונקען, ווערען די נערווען מיט דעם האַרץ אָבגעשוואַכט, און גוט
ווי פֿון צו פֿיעל טרונקען אַקעוויט אָדער בייגער.

נאָך קאפֿע ווערט נאָך וועניגער פֿערברײַכט שאַקאלאד מיט
קאקאא. אין קאקאא געפינט זיך אויך אַ גיפֿטיגער שטאָף וועלכער רופֿט
זיך Theobromin, אָבער פֿאַר דאָס געפֿונט זיך אין קאקאא אַנדערע גוטע
שטאָפֿען, וועלכע קרעפֿטיגען דעם אָרגאַניזם. אין קאקאא געפינט זיך
45% פֿעסץ, און אויך פֿיעל אַז-ווייט מיט קראַכמאַל. לויט די בעמישע
אַנאַליזע איז פֿערעכענט אז קאפֿע שפּיט צו בעסער דעם אָרגאַניזם ווי תּי,
און קאקאא מיט שאַקאלאד שפּיט צו נאָך בעסער ווי קאפֿע.

די קוועלע פֿון קאקאא איז אין אַמעריקאַ. דאָרט וואַקסט דאָס
אויף בוימער, אַזוי גרויס ווי די אַרבווען וואָס וואַקסען אין רוסלאַנד.
אין אַזאַ ניס געפֿונט זיך בערך 50 ברוינע קערענדלעך, אין יעדען
קערענדלע געפֿונט זיך אַ שוואַרצע יאָדע, פֿון וועלכע עס ווערט
געמאַכט דער קאקאא.

שאַקאלאד איז דאָס זעלבע וואָס קאקאא, נאָר עס ווערט צו גע-
מישט צוקער און אויך שמעקענדיגע געווינצען, עס וואָל האַבען אַ גוטען
גערויך. שאַקאלאד מיט קאקאא מעג מען טרונקען מעהר ווי קיין
מיט תּי.



דער אינהאלט פון דיעזען בוך :

ד

דאר .
דויאזא .

ה

האלדז .
האנד .
האר .
הארץ .
הוגד .
הוסט .
היועריג .
העמארידען .

ו

ווארצלען .
וואנצען .
ווערס .

ז

זאלב . 10 אפטיק-זאלבען .
זאמער-שפרענגלעך .
זויגערין .
זונקן-שלאג .

ח

חולירע ,
חלשות .

פאררעדע .

וועגען קראנקהייטען אין אלגעמיין .
וועגען די סמנים (סימפטאמען) פון די
קראנקהייטען .
וועגען אפטיק-געוויכטען .
וועגען א הייליכע אפטיקעל .

א

אויגען .
אויער .
אונטער-לייב .
אורין .
אנאניוס .
אסטמא .

ב

בויד .
בריסט .
בלוט .
בריה .

ג

גילט .
געבור-מוטער .
געווינערין .
גער-זוכט .
געשויד .
געשוועלעכץ .
געשלעכטס-קראנקהייטען .

ט

מאבאק-רױכערען.
משאר.

ק

כױס.

ל

לאקס-רען.
רונגען.
לױשעס.
לעבער.

מ

מאגען.
מאזאר.
מענדעוועסקעס.
מענער-שוואכרהיט.

נ

נאז.

פ

פאראגרא.
פאזען.
פויבער.
פױס-וועהטאג.

צ

צוקער.
צמן.

ק

קאקלושק, אַנקעל-הוסט
קאפ-וועהטאג.
קרוץ.
קרעספען.
קשיו.

ר

רױז.
רעגאל.
רעוואטיון.

ש

שווייץ.
שווינדזוכט.
שווערע-קרענק.
שמין.
שלאף.
שלינקערץ.
שקראפער.

ת

תה, קאפפער, שאקעלאר

